

# **Fortegnelse, kontrol dokument og brugervejledning kategori B**

## **Inventory, Control Document and User Instructions Category B**



# **Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori B**

Jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B

# **Inventory, Control Document and User Instructions of Active Pharmaceutical Ingredients and Medical Equipment Category B**

Cf. Danish Maritime Authority Notice A, chapter IX B

October 2020

ISBN: 978-87-7454-213-1

## Medicin certifikat / *Medicine Certificate*

Dette dokument anses for at udgøre skibets medicin certifikat.

Det attesteres herved, at medicin og medicinsk udstyr er eftersat og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

This document is considered to represent the ships certificate of medicine.

*It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.*

Skibsnavn / *Ship Name:*

Kaldesignal / *Call Signal:*

IMO nummer / *IMO Number:*

Hjemmehavn / *Port of Reg.:*

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

# Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1)

## *Certificate resuscitation equipment (A.1)*

Det attesteres herved at det **mobile genoplivningsudstyr (A.1)** er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

It certifies that the **mobile resuscitation equipment (A.1)** has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

## Indhold / Contents

Bruger guide – User Guide .....	5
Anvendte forkortelser – Used abbreviations .....	9
Brugervejledning Lægemidler – User Instruction Active Pharmaceutical Ingredients .....	10
Fortegnelse over Lægemidler - Inventory of Active Pharmaceutical Ingredients .....	49
Besætningens medbragte medicin - Crew member's private medicine.....	53
Fortegnelse over Medicinsk udstyr - Inventory of Medical equipment .....	55
Etiketter Lægemidler – Labels Active Pharmaceutical Ingredients.....	61
Indeks – Index .....	65
Rekvistion – Lægemidler - Requisition - Active Pharmaceutical Ingredients.....	69
Rekvistion - Medicinsk udstyr - Requisition - Medical Equipment .....	73
Ændringer / Changes.....	74

## De Danske Medicinkister

Medicinkisten angiver medicin/medicinsk udstyr, som Radio Medical Danmark og Søfartsstyrelsen har foretrukket indenfor de rammer som EU-direktiv 92/29/EØF og den Danske lægemiddelstyrelse har givet.

### Guide til:

#### Brugervejledning:

**Første kolonne** beskriver de indikationer, lægemiddelstoffet er beregnet til. De samme indikationer kan slås op i indekset bagerst i publikationen. Første kolonne beskriver også om et lægemiddelstof skal anvendes sammen med andre lægemiddelstoffer. I sådanne tilfælde er der lavet henvisninger til de relevante lægemiddelstoffer.

**Anden kolonne** oplyser, lægemiddelstoffets hoved- og undergruppenummer.

**Tredje og fjerde kolonne** indeholder rækker med oplysninger om:

- **Lægemiddelstoffet:** Beskriver det aktive stof i lægemidlet. Som et eksempel kan nævnes 3.1 Paracetamol. Det forhandles over hele jorden under mange forskellige handelsnavne. Derfor kan man uanset forskellige handelsnavne, altid finde lægemidlet, hvis man kender lægemiddelstoffet.
- **Form:** Beskriver om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klyasma, oral opløsning eller inhalation. Form beskriver også styrken af det enkelte lægemiddelstof pr ml eller per tablet.
- **Virkning** beskriver den forventende virkning af det enkelte lægemiddel.
- **Dosering** beskriver den anbefalede dosis ved de tilstande, der er beskrevet i kolonnen indikation. Her beskrives ligeledes lægemidlets form og administrationsmåde.  
*Bemærkning:* Radio Medical kan ordinere andre doser og administrations måder.
- **Bivirkninger** nævner de mest almindelige bivirkninger beskrevet i Dansk Lægemedelinformation, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk)
- **Holdbarhed** beskriver holdbarhedstiden fra produktions datoen. Holdbarhedstiden beskrevet i denne fortegnelse er fremkommet ud fra det danske handelsnavn med længst holdbarhed.  
*Bemærkning:* Der tages forbehold for at holdbarhedstiden kan ændres.
- **Opbevaring** beskriver om der er særlige krav til opbevaring. Lægemidler skal generelt opbevares tørt og beskyttet mod lys. De fleste lægemidler tåler "almindelig temperatur" defineret som normal stuetemperatur op til 22-24° C.
- **Anmærkninger** beskriver, om der bør søges samråd med Radio Medical Danmark inden anvendelse af lægemiddelstoffet. Desuden beskrives, om der er specielle forholdsregler til det specifikke lægemiddelstof.

**Advarsel:** Lægemiddelstoffer, der har været opbevaret forkert, eller er blevet for gamle, kan være sundhedsskadelige

## The Danish Medicine Chest's

The medicine chest indicates the Active Pharmaceutical Ingredients / medical equipment that Radio Medical Denmark and Danish Maritime Authority have preferred within the framework of the EU Directive 92/29 / EEC and the Danish Medicines Agency.

### Guide to:

#### User instruction:

**First column** describes the indication the Active Pharmaceutical Ingredients is intended for. The same indications can be looked up in the index at the back of the publication. First column also describes whether an active pharmaceutical ingredient should be used together with other active pharmaceutical ingredients. In such cases, a reference is made to the relevant Active Pharmaceutical Ingredient.

**Second column** describes the Active Pharmaceutical Ingredient main and subgroup numbers.

**Third and fourth column** contains a number of information about:

- **The Active Pharmaceutical Ingredients:** describe the Active Pharmaceutical Ingredients in the medicine. An example is 3.1 Paracetamol, which is sold all over the world under many different trade names. Regardless of different trade names it is always possible to locate the medicine, if you know the Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Form:** describes if the Active Pharmaceutical Ingredients is available as capsules, tablets, suppositories, injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation. Form also describes the strength of each Active Pharmaceutical Ingredients per ml or per tablet.
- **Effect** describes the expected effect of each Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Dosage** describes the recommended dose for the condition described in the column indication. The form of the Active Pharmaceutical Ingredients as well as the usual administration is mentioned.  
*Note:* Radio Medical may prescribe different doses and ways of administration.
- **Side effects** describes the most common side effects mentioned in the Danish Drug Information, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk). There is currently no English version.
- **Durability** describes the time of durability from date of production. The durability mentioned in this record is derived from the Danish trade name with the longest durability.  
*Note:* Durability may be subject to change.
- **Storage** describes if special storage precautions are needed. The Active Pharmaceutical Ingredients should generally be kept dry and protected from light. Most medicaments tolerate "normal temperature" defined as normal room temperature up to 22-24° C.
- **Remarks** describe whether it is recommended to seek advice from Radio Medical Denmark before using the Active Pharmaceutical Ingredients. In addition, precautions needed for the specific Active Pharmaceutical Ingredients are described.

**Warning:** Active Pharmaceutical Ingredients which have been stored improperly or are too old can be harmful to health

## Guide til:

### Fortegnelse og kontroldokument lægemiddelstoffer.

Publikationen indeholder en fortegnelse over de lægemiddelstoffer, der skal være ombord.

#### Rækkerne

Lægemiddelstofferne er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle smertestillende lægemiddelstoffer organiseret i gruppe 3.

#### Kolonnerne

**Første kolonne** beskriver hvert enkelt lægemiddelstoffs nummer. Eksempelvis har morfin nummeret 3.4, hvor tallet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke lægemiddelstof. Lægemiddelstofferne i skibets hospital skal så vidt muligt organiseres efter dette nummersystem

**Anden kolonne** beskriver ATC koden, et klassifikations system for medicin. Se mere på [www.whooc.no](http://www.whooc.no)

**Tredje kolonne** beskriver lægemiddelstoffet.

*Bemærkning:* Efter lægemiddelstoffet kan være anført et "Δ", dersom produktet er sløvende, og et "K", dersom produktet skal opbevares i køleskab.

**Fjerde kolonne** beskriver under "Adm.form", om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klysma, oral opløsning eller inhalation.

**Femte kolonne** beskriver styrken pr tablet eller pr. ml.

**Sjette kolonne** beskriver mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

### Besætningens medbragte medicin

Besætningen har ret til at medbringe egen medicin under den forudsætning, at de til stadighed har en gyldig helbredsundersøgelse for søfarende og fiskere. Medbragte lægemidler skal oplyses til skibsføreren eller sygdomsbehandleren. Lægemidlet skal indskrives med følgende oplysninger:

- Lægemidlets navn
- Navn på besætningsmedlem
- Mængde og antal
- Daglig dosis
- Dato ind
- Eventuel kvittering for modtagelsen. (Kun hvis lægemidlet opbevares på sygelukafet)
- Dato ud
- Kvittering for modtagelsen (Kun hvis lægemidlet har været opbevaret på sygelukafet)

## Guide to:

### Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients.

The publication contains an inventory of mandatory Active Pharmaceutical Ingredients on board.

#### The rows

The Active Pharmaceutical Ingredients are organized into main groups according to field of application. As an example all analgesics are organized in group 3.

#### The columns

**First column** describes each individual Active Pharmaceutical Ingredient by number. For example, morphine number 3.4, where the number before the dot refers to the main group and the number after the dot refers to the specific active pharmaceutical ingredients. The Active Pharmaceutical Ingredients in the ship's hospital must as far as possible be organized after this numbering system.

**Second column** describe the ATC code, a classification system on medicine. See more on [www.whooc.no](http://www.whooc.no).

**Third column** describes the Active Pharmaceutical Ingredients.

*Note:* The Active Pharmaceutical Ingredients can be marked with a "Δ" if the product is sedative and a "R" if the product should be stored in a refrigerator

**Fourth column** describes under "Adm.form" whether the Active Pharmaceutical Ingredients should be available as capsules, tablets, suppositories injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation.

**Fifth column** describes the strength per tablet or per ml.

**Sixth column** describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry greater amounts than described.

### Private medicine of crewmembers

The crew has a right to bring there own medicine, provided they possess a valid health certificate for seafarers and fishermen at all time. The master or the person in charge of medical care has to be informed about medicine brought along. The medicine must be registreted with the following information:

- Name of the medicine
- Name of crewmember
- Amount
- Daily dosage
- Date in
- Possible receipt for recieved medicine.  
(Only if the medicine is stored at the sickbay)
- Date out
- Sign when medicine is returned (Only if the medicine has been stored in the sickbay)

## Guide til:

### Fortegnelse og kontroldokument medicinsk udstyr.

Publikationen indeholder en fortegnelse over det medicinske udstyr, der skal være om bord.

#### Rækkerne

Det medicinske udstyr er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle forbindinger og plastre organiseret i gruppe B.

**Første kolonne** beskriver det enkelte medicinske udstyrs bogstav og nummer. Eksempelvis har "Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m", kombinationen nummeret B.9, hvor bogstavet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke medicinske udstyr.

**Anden kolonne** beskriver det specifikke medicinske udstyr.

**Tredje kolonne** beskriver den mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

### Medicinkiste- / Mobilt genoplivningsudstyr certifikat.

Mindst en gang årligt skal skibets lægemiddelstoffer og medicinskeudstyr gennemgås. Mobilt genoplivnings udstyr hver 3. måned. Ved gennemgangen kontrolleres mængden, opbevaringsforhold, udløbsdato og etiketter. Nåle, kanyler og metalinstrumenter kontrolleres for rust. Kontroller, at emballagen er intakt. Vær opmærksom på, at lægemiddelstoffer og medicinsk udstyr skal opbevares tørt og mørkt, og ikke må opbevares i nærheden af klor.

#### Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.

På side 3 og 4 i denne publication er udformet en blanket som, kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

#### Det mobile genoplivningsudstyr

Søfartsstyrelsen har fastsat regler om ilt og det mobile genoplivningsudstyr i gældende Meddelelser A kapitel IX B (Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin). Man kan derudover pakke førstehjælpsudstyr og lægemidler til førstehjælp sammen med det mobile genoplivningsudstyr. Der er udarbejdet forslag til pakning af et mobilt genoplivningsudstyr på [www.soefartsstyrelsen.dk](http://www.soefartsstyrelsen.dk).

#### Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.

På side 2 og 3 er Medicinkiste – og mobilt genoplivningsudstyrs certifikat, som også kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

#### Etiketter

Publikationen indeholde en kopi af de etiketter, der skal være på lægemiddelstofferne ved levering. Kopien kan anvendes som kontrol af, at lægemiddelstoffet er korrekt og påført den korrekte etiket. Er det ikke tilfældet, bør skibsføreren retlede sin leverandør.

Ved køb af lægemiddelstof ved apotek, kan en kopi af etiketterne afleveres ved leverandøren. Derefter skal leverandørerne påføre de korrekte etiketter, før udlevering

#### Indeks

Indexet henviser til brugervejledningen af lægemiddelstoffer i

## Guide to:

### Inventory and Control Document of Medical Equipment.

The publication contains an inventory of the mandatory medical equipment onboard

#### The rows

The medical equipment is organized into main groups according to their main field of application. For example all dressings and plasters are organized in group B.

**First column** describes each individual medical equipment by number. The "elastic gauze", approx. 4 cm x 4 m, carries the combination B.9. The letters before the dot refers to the main group, and the number after the dot refers to the specific medical equipment.

**Second column** describes the specific medical equipment.

**Third column** describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry larger quantities than described.

### Medicine chest - / Mobile Resuscitation Equipment certificate

At least once a year the ship's Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment must be reviewed. The mobile resuscitation equipment every 3 month.

When reviewing the quantities, storage conditions, expiry date and labels are controlled. Needles, cannulas and metal instruments are checked for rust. Check if the packaging is intact. Be aware that the medicament and equipment must be stored dry and dark, and not near chlorine.

#### Documentation of 3 month and annual inspection

On page 3 and 4 in this publication are forms that can be used to document the inspections. Print the pages and let the Master sign them.

#### The Mobile Resuscitation Equipment

The Danish Maritime Authority has established rules for oxygen and the mobile resuscitation equipment in the current Notice A chapter IX B (Examinations, treatment and ship medicine). In addition you may pack equipment and medicine suited for first aid with the resuscitation equipment. Suggestions for the list may be found on [www.dma.dk](http://www.dma.dk).

#### Documentation of 3 months and annual inspection.

On page 2 and 3 is Medicine chest- and mobile resuscitation equipment's certificate's. It can also be used to document the inspections. The page's has to be printed and the Master has to sign them.

#### Labels

The publication contains copies of the labels that must be on each active pharmaceutical ingredient, at the time of delivery. The copy may be used as verification of proper product and label. If labelling is incorrect, the master should guide his supplier.

When purchasing Active Pharmaceutical Ingredients a copy of the label may be delivered to the supplier. Then the supplier applies the correct labels before delivery.

#### Index

The index refers to the user instruction of active pharmaceutical ingredients. You can search for diseases, symptoms and Active Pharmaceutical Ingredients in the index.



indekset kan du søge på visse sygdomme, symptomer og alle lægemiddelstoffer.

### **Rekvision**

Bagerst i publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemidler og medicinsk udstyr.

### **Dispensation for andet lægemiddelstof**

Det er ikke til alle tider, og i alle lande muligt at indkøbe det foretrukne lægemiddelstof. Den danske Søfartsstyrelse og Radio Medical Danmark har derfor udarbejdet en liste med godkendte alternativer. Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen med godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation.

Hvis apotek/forhandler tilbyder lægemiddelstof, som ikke findes på nogen liste, skal der søges om dispensation for anden medicin. Dette gøres på Søfartsstyrelsen hjemmeside, hvor der er en procedure for "Dispensation for anden medicin".

Listen over godkendte alternative, og dertil hørende labels og brugervejledninger kan downloades fra [www.sofartsstyrelsen.dk](http://www.sofartsstyrelsen.dk). Listen med godkendte alternativer findes i Excel format.

### **Hjælp**

Er der noget du er i tvivl om, står Søfartsstyrelsen Center for det Maritime Sundhedsvæsen til din rådighed. Adressen er:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telefon: +45 7219 6004  
Email: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

### **Requisition**

In the back of the publication is a requisition available. You simply fill in the required quantities of the Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment.

### **Exemption for other active pharmaceutical ingredients**

It is not at all times and in all countries possible to purchase the preferred Active Pharmaceutical Ingredients. The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have therefore drawn up a list of approved alternatives. If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for exemption.

If the pharmacy / retailer offer Active Pharmaceutical Ingredients that is not on the inventory- or alternative list, you must apply for an exemption. This is done on the DMA website, where there is a procedure for "exemption of medicine".

The list of approved alternative, and associated labels and user instructions can be downloaded from [www.dma.dk](http://www.dma.dk). The list of approved alternatives is available in Excel format.

### **Help**

If you have any questions, the Danish Maritime Authority's Centre of Maritime Health Service is at your disposal. The address is:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telephone: +45 7219 6004  
E-mail: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

## Anvendte forkortelser m.v. i Fortegnelse og Brugervejledning

afd. Pul.	=	afdelte pulvere
htgl.	=	hætteglas
i. m.	=	intramuskulært = i musklen
inf. Væs.	=	infusionsvæske (til intravenøs brug)
inh. Pul.	=	inhalationspulver
inj. væske	=	injektionsvæske (til i.m. eller s.c.injektion)
i. v.	=	intravenøst = i en vene
"K"	=	opbevares i køleskab
klysma	=	klysma til anvendelse i endetarmen
linim.	=	liniment
gas	=	luftformig gasart til medicinsk anvendelse
mixtur	=	væske som drikkes
næsedr.	=	næsedråber
opløsn.	=	opløsning
s.c.	=	subcutant = under huden
supp.	=	suppositorier = stikpille til brug i endetarmen
Δ	=	sløvende medicin, kan påvirke evnen til maskinbetjening og vagttjeneste
π	=	Receptpligtig medicin

## Used abbreviations etc. In the Inventory and User instruction

d.p.	=	divisional powder
c.v	=	cappedvials
i. m.	=	intramuscular = in the muscle
inf. fl.	=	infusion fluid (for intravenous use)
inh. p.	=	inhalation powder
inj. subst.	=	injection substance (for reconstitution before use)
inj. liquid	=	injection fluid (for i.m. or s.c. injection)
i. v.	=	intravenous = in a vein
"R"	=	stored in refrigerator
enema	=	enema for use in the rectum
linim.	=	liniment
gas.	=	gas for medical use
mixture	=	drinkable liquid
nose d.	=	nose drops
diss.	=	dissolution
s.c.	=	subcutaneous = under the skin
supp.	=	suppositories = suppository for rectal use
Δ	=	sedative medicine, may effect the ability to operate machinery and bridge duty
π	=	Prescription drugs

**Brugervejledning Lægemiddelstoffer**  
**User instruction Active Pharmaceutical**  
**Ingredients**

**Grp. 1. Ilt / Oxygen**

Bevidstløs uden vejtrækning Bevidstløs med vejtrækning Medtaget almen tilstand Slag mod kraniet Større kvæstelser Vejtrækningsbesvær  MFAG tabel 2, 3, 5, 9, 11	1.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Medicinsk ilt.
		<b>Form:</b>	Luft på trykflasker.
		<b>Virkning:</b>	Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.
		<b>Dosering:</b>	Bevidstløse uden vejtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut. Bevidstløse med vejtrækning: Maske med 9 liter/min. Øvrige tilstande: Maske med 1 til 9 liter/min.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ilt er ufarligt til medicinsk brug.
		<b>Holdbarhed:</b>	Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA)
		<b>Opbevaring</b>	Flasker holdes under 50°C
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Unconscious without breathing Unconscious with breathing Weak general condition Blows to the skull Severe injuries Breathing difficulties  MFAG table 2, 3, 5, 9, 11	1.3	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Medical oxygen.
		<b>Form:</b>	Gas in pressurized bottles.
		<b>Effect:</b>	Induces oxygen to the cells via the red blood cells.
		<b>Dosage:</b>	Unconscious without breathing: Manual ventilation, 15 litres per minute. (A.1) Unconscious with breathing: Oxygen mask, 9 litres per minute. Other states: Oxygen mask, 1 to 9 litres per minute.
		<b>Side-effects:</b>	Oxygen is not dangerous when used for medicinal
		<b>Validity:</b>	Bottles 3 years from productions date (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA)
		<b>Storage:</b>	Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50° C
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 2. Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics**

Lokalbedøvelse Syning af sår	2.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lidocain.
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 10 mg/ml til subcutan injektion.
		<b>Virkning:</b>	Lokalbedøver på injektionsstedet. Virker efter 1 - 2 minutter. Virker i 2 - 3 timer.
		<b>Dosering:</b>	Mængden afhænger af sårets størrelse. Normalt anvendes 20 - 50 mg. Maksimaldosis er 20 ml svarende til 200 mg. Se Søfartsstyrelsens
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergi er sjælden. Ved utilsigtet injektion i blodbanen kan der opstå: 1. føleforstyrrelser, svimmelhed, uklarhed og øresusen, 2. synsforstyrrelser, muskelrysten og kramper, 3. blodtryksfald og langsom puls.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Må ikke fryses.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lokalbedøvelse skal ske i et rum med adgang til adrenalin (4.1) og genoplivningsudstyr (A.1). Risiko for alvorlige bivirkninger, hvis lidocain injiceres i blodbanen.

Local anaesthetics Suture of wounds	2.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Lidocaine.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 10 mg/ml for subcutaneous injection.
		<b>Effect:</b>	Anaesthetises the place of injection. Takes effect after 1-2 minutes. Effective for 2-3 hours.
		<b>Dosage:</b>	The amount depends on the size of the wound. Normally, 20-50 mg is used. The maximum dose is 20 ml, equivalent to 200 mg. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.
		<b>Side-effects:</b>	Allergy seldom occurs. In case of an unintended injection into the bloodstream, the following side-effects may occur: 1. affective disturbances, dizziness, confusion, and buzzing in the ears, 2. visual disturbances, muscle contractions, and convulsions, 3. falling blood pressure and slow pulse.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. Not to be frozen.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Local anaesthetics must be administered in a room with access to adrenaline (4.1) and resuscitation equipment (A.1). Risk of serious side-effects if lidocaine is injected directly into the bloodstream.
Lokalbedøvelse Kløestillende	2.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lidocain.
		<b>Form:</b>	Gel, 20 mg/g (2%).
		<b>Virkning:</b>	Lokalbedøver hud og sårrende. Kløestillende.
		<b>Dosering:</b>	Anvendes som lokalbedøvelse ved smertende sår eller smertefulde procedurer, fx ved rengøring af brandsår eller større og forurenede sår. Et tykt lag gel påsmøres huden, der herefter afdækkes lufttæt i ca. 15 minutter. Virker efter ca. 15 minutter. Virker i ca. 30 minutter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergi er sjælden.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Local anaesthetics Relieves itching	2.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Lidocaine.
		<b>Form:</b>	Gel, 20 mg/g (2%).
		<b>Effect:</b>	Anaesthetises the skin and the edges of wounds. Relieves itching.
		<b>Dosage:</b>	To be used as local anaesthetics in case of painful wounds or procedures, e.g. cleansing of burns or large, dirty wounds. A thick layer is applied to the skin, which is subsequently covered in an air-proof condition for about 15 minutes. Takes effect after about 15 minutes. Effective for about 30 minutes.
		<b>Side-effects:</b>	Allergy seldom occurs.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

### Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

Feber Svage smerter: Hovedpine Muskelsmerter Ledsmarter Rygsmerter  MFAG tabeller: 7, 8, 13	3.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Paracetamol.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 500 mg.
		<b>Virkning:</b>	Febernedsættende og smertestillende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 1 g 3 - 4 gange dagligt. Højest 4 g per
		<b>Bivirkninger:</b>	Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverskade, leversvigt og død.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Ingen.
Fever Weak pains: Headache Muscle pains Pain in joints Back pains  MFAG tables: 7, 8, 13	3.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Paracetamol.
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg.
		<b>Effect:</b>	Pain relieving and reduces fever.
		<b>Dosage:</b>	Adults: 1 g three-four times daily. Not more than 4 g daily.
		<b>Side-effects:</b>	Doses of more than 15-20 g involve liver damage, liver failure, and death.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	None.
Moderate smerter: Menstruationssmerter Ledsmarter Knoglesmerter Knoglebrud Muskelsmerter	3.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Ibuprofen.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 400 mg.
		<b>Virkning:</b>	Smertestillende og febernedsættende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 400 mg 3 - 4 gange dagligt. Højest 1800 mg per døgn. Undtagelsesvist op til 2400 mg per døgn i kortere
		<b>Bivirkninger:</b>	Ondt i maven.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Ibumetin®, Nycomed)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre, 2. astmapatienter, 3. patienter i blodfortyndende behandling, 4. patienter med symptomer på mavesår.

Moderate pains: Period pains Pain in joints Bone-ache Fractures Muscle pains	3.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Ibuprofen.
		<b>Form:</b>	Tablets of 400 mg.
		<b>Effect:</b>	Pain relieving and reduces fever
		<b>Dosage:</b>	Adults: 400 mg three-four times daily. Not more than 1800 mg daily. Exceptionally, up to 2400 mg daily for shorter periods of time (4-6 weeks).
		<b>Side-effects:</b>	Stomach ache.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Ibumetin®, Nycomed Danmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid, 2. asthma patients, 3. patients in blood diluting treatment, 4. patients with symptoms of ulcer.
Stærke smerter: Store sårskader Kvæstelser Forbrændinger Knoglebrud Nyresten Galdesten Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin)  MFAG tabel 7, 8,10,13	3.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Morfin $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à 1 ml.
		<b>Virkning:</b>	Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (sc.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer
		<b>Dosering:</b>	Subcutant og intramuskulært (voksne). 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.
		<b>Bivirkninger:</b>	Svækker vejrtrækningen. Kvalme og opkastning.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved overdosering kan vejrtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1) Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemidler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Observer vejrtrækningen og ventilere om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske

Severe pain Major wounds Injuries Burns Fractures Kidney stone Gall stone Coronary thrombosis (see first aid under 9.1 Glyceryl trinitrate)  MFAG Tabel 7,8,10,13	3.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Morphine $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.
		<b>Effect:</b>	Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection. Takes effect immediately in case of intravenous injection Effective for 3-4 hours
		<b>Dosage:</b>	Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient. Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not
		<b>Side-effects:</b>	Restricts breathing. Nausea and vomiting. Restricts the absorption of medicaments from the stomach. May cause constipation and restrict bladder emptying.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be protected from light.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> In case of an overdose, the patient may stop breathing. Antidote: Naloxone (5.1) This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage. Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1).
Lette til moderate smerter	3.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Tramadol $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Kapsel à 50 mg
		<b>Virkning:</b>	Smertestillende
		<b>Dosering:</b>	100 – 200 mg dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, svimmelhed, mundtørhed, opkastning, obstipation. Hovedpine, døsighed, træthed. Øget svedtendens.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato, (Tadol, PharmaCoDane ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes
Weak to moderate pain	3.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Tramadol $\Delta$
		<b>Form:</b>	Capsule of 50 mg
		<b>Effect:</b>	Pain relieving
		<b>Dosage:</b>	100-200 mg daily
		<b>Side-effects:</b>	Dizziness, nausea, vomiting, constipation, dry mouth, head ache, drowsiness, fatigue, increased sweating.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production ( Tadol, PharmaCoDane ApS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medial</i> . Should not be used in case of pregnancy.



## Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge

Allergisk shock	4.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Adrenalin.
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammenækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.
		<b>Dosering:</b>	Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.
		<b>Bivirkninger:</b>	Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Adrenalin <sup>®</sup> , DAK), hvis opbevaret ved 2-8 °C. 6 måneder fra udlevering (Adrenalin <sup>®</sup> , DAK), hvis opbevaret under 25 °C
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt og mørkt.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.
Allergic shock	4.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Epinephrine.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes.
		<b>Dosage:</b>	Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.
		<b>Side-effects:</b>	High blood pressure, rapid pulse, shivering, and
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Adrenalin <sup>®</sup> , DAK), if stored at 2 °C - 8 °C or 6 months after extradition if stored less than 25 °C
		<b>Storage:</b>	To be stored in a cool and dark place.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Potentially fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.

Allergi Høfeber Nældefeber Allergisk ansigtsødem Allergisk astma	4.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Acrivastin.
		<b>Form:</b>	Kapsler à 8 mg.
		<b>Virkning:</b>	Modvirker allergi. Maksimal virkning efter 1½ - 2 timer. Virkningsvarighed op til 8
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 8 mg efter behov. Maksimalt 3 gange per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Døsighed kan forekomme og forstærkes af alkohol og beroligende midler, herunder
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Benadryl®, McNeil ApS).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lægemidlet er ikke mærket med $\Delta$ men enkelte personer sløves alligevel så meget, at det er uforsvarligt med vagttjeneste eller maskinbetjening. Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Hay fever Urticaria Allergic face oedema Allergic asthma	4.2	<b>Active pharmaceutical</b>	Acrivastine.
		<b>Form:</b>	Capsule of 8 mg.
		<b>Effect:</b>	Eases allergic symptoms. Maximum effect after 1.5-2 hours. Effective for up to 8
		<b>Dosage:</b>	Adults: 8 mg when required. Maximum three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Drowsiness may occur and is increased by the use of alcohol and sedatives, including sleeping
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Benadryl®, McNeil Denmark ApS).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . The medicament is not marked with a $\Delta$ , but some patients experience a high degree of drowsiness, making bridge duty and operations of machinery unsafe. In case of symptoms of from the lungs: See group 15.

Allergi Allergisk astma Allergisk ansigtsødem	4.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Hydrocortison.
		<b>Form:</b>	Injektionssubstans 100 mg i to-delt hætteglas med 2 ml sterilt vand til intramuskulært eller intravenøst
		<b>Virkning:</b>	Modvirker allergi og inflammationer. Virkningen indtræder først 4 - 6 timer efter injektion, hvorfor anden akut behandling skal dække dette
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 100 mg intramuskulært eller intravenøst som éngangsdosis.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ved længere tids anvendelse: Forstyrrelser i sukker, vand- og saltstofskeft og i kirtlernes funktion. Sløring og/eller aktivering af infektioner. Eufori, sindsyge og søvnløshed. Ondt i maven og mavesår.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Brugsfærdig injektionsvæske holdbart i 72 timer, hvis opbevaret i køleskab.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Allergic asthma Allergic face oedema	4.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Hydrocortisonsuccinate
		<b>Form:</b>	Injection substance, 100 mg in capped vial divided into two sections, with 2 ml sterile water for intramuscular or intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Eases symptoms of allergy and inflammations. Does not take effect until 4-6 hours after the injection. Other acute treatment to cover this period is needed
		<b>Dosage:</b>	Adults: 100 mg given intramuscularly or intravenously as a single dose.
		<b>Side-effects:</b>	If used for a extended period: Disturbances in the sugar, water and salt metabolism and in the glandula functions. Masking and/or activation of infections. Euphoria, mental illness and insomnia. Stomache ache and ulcer.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Injection liquid ready for use, valid for 72 hours, if stored cold.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be kept out of daylight. Injection liquid ready for use, to be stored refrigeated.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of symptoms from lungs See also group 15.

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge		(continued)	
Søsyge	4.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Cinnarizin $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tablet à 25 mg.
		<b>Virkning:</b>	Modvirker søsyge.
		<b>Dosering:</b>	25 mg en ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
		<b>Bivirkninger:</b>	Døsighed
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).
Seasickness	4.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Cinnarizin $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tablet à 25 mg.
		<b>Effect:</b>	Modvirker søsyge.
		<b>Dosage:</b>	25 mg en ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
		<b>Side-effects:</b>	Døsighed
		<b>Validity:</b>	5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
		<b>Storage:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Remarks:</b>	Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).

Grp. 5. Antidoter / Antidotes			
Modgift ved overdosering af morfin  MFAG tabel 4, 13  Førstehjælp: Ved udsættende vejtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l/ minut.	5.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Naloxon.
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker 2 - 3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.
		<b>Dosering:</b>	1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært. 2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).
		<b>Opbevaring:</b>	Beskyttes mod lys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Antidote to be administered in case of an overdose of morphine  MFAG table 4, 13  First Aid: If the patient stops breathing, assist breathing manually with oxygen 15l/minute on a mask.	5.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Naloxone.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.
		<b>Dosage:</b>	1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immediately intramuscular. 2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.
		<b>Side-effects:</b>	Shivering, feeling unwell, and vomiting.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).
		<b>Storage:</b>	To be protected from daylight.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glucagon.
		<b>Form:</b>	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.
		<b>Virkning:</b>	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5 - 10 minutter.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 - 15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray
		<b>Holdbarhed:</b>	Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8° C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur eller 2 - 8° C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	<b>Active pharmaceutical</b>	Glucagon.
		<b>Form:</b>	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		<b>Effect:</b>	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		<b>Dosage:</b>	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl
		<b>Validity:</b>	At room temperature: 18 months from the date of production (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature or 2-8° C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.

**Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion**

<p>Angst og urotilstande Alkoholabstinenser Forebyggelse af kramper Ledskred og brud</p> <p>1. valgspræparat ved akut sindsyge (alternativt anvendes klysma (6.3))</p>	6.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Diazepam $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tabletter à 5 mg.
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker efter 30 minutter. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		<b>Dosering:</b>	5 mg x 3 dagligt. Akut sindsyge: Dosis efter aftale med <i>Radio Medical</i> . Se også 6.4.
		<b>Bivirkninger:</b>	Vanedannende. Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Diazepam, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
<p>Anxiety and states of restlessness Alcoholic withdrawal symptoms Prevention of convulsions Dislocations and fractures</p> <p>First choice of medicament in case of acute mental disease (alternatively, Enema (6.3) are used.)</p>	6.2	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Diazepam $\Delta$
		<b>Form:</b>	Tablets of 5 mg.
		<b>Effect:</b>	Strongly sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect after 30 minutes. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		<b>Dosage:</b>	5 mg three times daily Acute mental disease: Dosage after consultation with Radio Medical. See also 6.4.
		<b>Side-effects:</b>	Addictive. Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Diazepam, Nycomed Danmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
<p>Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi</p> <p>Akut sindsyge</p> <p>MFAG tabel 4, 5, 6</p>	6.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Diazepam $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Klysma, 5 mg/ml, til anvendelse i endetarmen
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		<b>Dosering:</b>	Efter samråd med Radio Medical - 1 klysma tømmes i endetarmen.
		<b>Bivirkninger:</b>	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid <sup>®</sup> , Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur..
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy  Acute mental illness  MFAG tabel 4, 5, 6	6.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Diazepam. $\Delta$
		<b>Form:</b>	Enema, 5 mg /ml for insertion into the rectum.
		<b>Effect:</b>	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		<b>Dosage:</b>	After consult with Radio Medical - 1 enema emptied into the rectum.
		<b>Side-effects:</b>	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		<b>Validity:</b>	2,5 years from the date of production (Stesolid <sup>®</sup> , Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
2. valgspræparat ved akut sindsyge præget af mani, vildskab, psykisk og Motorisk uro, angst, vrangforestillinger og hallucinationer.  Kvalme og opkastninger	6.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Haloperidol $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 5 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Afdæmper symptomerne ved sindsygen. Dæmper kvalme og opkastninger.
		<b>Dosering:</b>	Akut sindsyge: 5 - 10 mg intramuskulært. Kan eventuelt gentages 3 eller flere gange dagligt. Behandlingen kan eventuelt forstærkes med diazepam (6.2/6.3).
		<b>Bivirkninger:</b>	Den sløvende effekt forstærkes af alkohol, morfin og andre sløvende midler.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Serenase <sup>®</sup> , Janssen-Cilag).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of acute mental illness characterized by mania, wildness, mental and motoric restlessness, anxiety, delusions, and hallucinations.  Nausea and vomiting	6.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Haloperidole. $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injection liquid 5 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Restricts the symptoms of mental disease. Reduces nausea and
		<b>Dosage:</b>	Acute mental disease: 5-10 mg intramuscularly. May be repeated three times daily or more. The treatment may be enhanced by the use of diazepam (6.2/6.3).
		<b>Side-effects:</b>	The sedative effect is increased by alcohol, morphine, and other sedatives.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Serenase <sup>®</sup> , Janssen-Cilag).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical.

**Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion**

(continued)

Søvnløshed Indsovningsbesvær	6.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Zolpidem $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tabletter à 10 mg.
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende Virker hurtigt efter indtagelse Virkningen varer op til 6 timer Virkningen forstærkes af andre sløvende stoffer, herunder alkohol
		<b>Dosering:</b>	Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré, hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, svimmelhed, døsigthed, hudreaktioner, dobbeltsyn.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Zolpidem Hexal A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Insomnia Difficulty falling asleep	6.5	<b>Active pharmaceutical</b>	Zolpidem $\Delta$
		<b>Form:</b>	Tablets of 10 mg
		<b>Effect:</b>	Strong sedative, rapid effect after ingestion, Effective up till 6 hours. The effect is increased by the use of other sedatives, including alcohol
		<b>Dosage:</b>	Adults. 10 mg 15-30 minutes. before bedtime.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhea headache, difficulty concentrating, confusion, memory loss, dizziness, drowsiness, skin reactions, double vision
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Zolpidem Hexal A/S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .



Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections			
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse	7.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Phenoxymethylpenicillin
		<b>Form:</b>	Tabletter à 660 - 800 mg (ca.1 mill. IE)
		<b>Virkning:</b>	Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene
		<b>Dosering:</b>	400 mg – 800 mg x 2 – 4 dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, diarré og hududslæt. Sjældent ses overfølsomhedsshock
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Primicillin®, MEDA)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1)
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia	7.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Phenoxymethylpenicillin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU)
		<b>Effect:</b>	Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.
		<b>Dosage:</b>	400-800 mg x 2-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Vomiting, diarrhoea and rash. Rarely allergic shock
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production ( Primicillin®, MEDA)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner  Alternativ til penicillin ved allergi  MFAG tabel 9	7.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Erythromycin.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 500 mg.
		<b>Virkning:</b>	Standser bakteriernes vækst.
		<b>Dosering:</b>	250 - 500 mg x 2 - 4 dagligt. Ved alvorlig infektion kan dosis øges til 4 g per døgn. Tabletter gives umiddelbart før måltid. (Enterotabletter gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter).
		<b>Bivirkninger:</b>	Madlede, kvalme, mavekneb og forbigående diaré.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Abbotcin, Amdipharm Limited).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer  Alternative to penicillin in case of allergy  MFAG table 9	7.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Erythromycin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg.
		<b>Effect:</b>	Stops bacterial growth.
		<b>Dosage:</b>	250-500 mg two-four times daily case of a serious infection, the dose may be increased to 4 g a day. Tablets are given immediately before a meal. (Enterotablets are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest).
		<b>Side-effects:</b>	Loss of appetite, nausea, stomach cramp, or transient diarrhoea.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Abboticin, Amdipharm)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Halsbyld Tandbyld  Knogleinfektion  Underlivsinfektioner Tarminfektioner Blindtarmsbetændelse  MFAG tabel 10	7.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Metronidazol.
		<b>Form:</b>	Stikpille à 500 mg
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende.
		<b>Dosering:</b>	500 mg x 3 daglig
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, forstoppelse, og smagsforstyrrelse. Mørkfarvet urin. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/ S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan om nødvendigt anvendes, til gravide. Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, fx Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9). Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dexofan.
Boil in the throat Tooth abscess  Bone infection Infection of female reproductions organs Abdominal infections Intestinal infections Appendicitis (Check dipstick G.1)  MFAG table 10	7.7	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Metronidazol.
		<b>Form:</b>	Suppository of 500 mg
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria.
		<b>Dosage:</b>	500 mg three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Nausea vomiting, abdominal pain, diarrhea, constipation, and taste disturbance. Dark colored urine. May cause a reaction similar to Antabuse in connection with alcohol.
		<b>Validity:</b>	3 years from productions date (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/ S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . May be used during pregnancy, if nessasary. Often used in combination with other antibiotics e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9). May not be used with 15.1 Dextromethorphan

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
Tandbyld Halsbyld Svær bronkitis Lungepest  Akut diarré Kolera Dysenteri Blindtarmsbetændelse Gonoré Urinrørsbetændelse Nyrebækkenbetændelse (tjek urinstiks G.1)	7.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Ciprofloxacin.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 250 mg.
		<b>Virkning:</b>	Dræber bakterier.
		<b>Dosering:</b>	250 - 750 mg x 2 dagligt. Tabletterne gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Mavekneb, kvalme, opkastninger, madlede, hovedpine, svimmelhed, træthed og kramper, muskel-, led- og seneømhed, allergi, overfølsomhedsreaktion ved samtidig udsættelse for sollys.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Cifin, PharmaCoDane ApS).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7). Må ikke gives til gravide eller ammende.
Boil in the throat Tooth abscess Severe bronchitis Pneumonic plague Acute diarrhoea Cholera Dysentery Appendicitis Gonorrhoea Urethritis Pyelitis (Check dipstick G.1)	7.8	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Ciprofloxacin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 250 mg.
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria.
		<b>Dosage:</b>	250-750 mg twice daily The tablets are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest.
		<b>Side-effects:</b>	Bellyache, nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, fatigue, and convulsions. Soreness in the muscles, joints and tendons. Allergy. Allergic reaction in case of simultaneous exposure to sunlight.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Cifin, PharmaCoDane Aps).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. Is given in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections. Should not be given to pregnant or breast-feeding

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**

(continued)

<p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunoglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>	7.10	<b>Lægemiddelstof:</b>	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske
		<b>Virkning:</b>	Aktiverer patientens immunsystem.
		<b>Dosering:</b>	Følg ordination fra Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke
	<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .	
<p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.10	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		<b>Form:</b>	Injection liquid
		<b>Effect:</b>	Activates the patient's immune system.
		<b>Dosage:</b>	Follow prescription from Radio Medical
		<b>Side-effects:</b>	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		<b>Storage:</b>	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
	<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .	

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections** (continued)

<p>Stivkrampemodgift</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Tetanus immunglobulin suppleres med vaccine (se 7.10).</p> <p>Behandlingen skal ske i behandlingsrum med adgang til 4.1 Adrenalin og A.1 Genoplivnings-udstyr.</p>	7.11	<b>Lægemiddelstof:</b>	Humant tetanus immunglobulin.
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 250 I.E. Ampul à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Bekæmper giftstoffer produceret af stivkrampebakterien.
		<b>Dosering:</b>	1 injektion à 250 I.E. (1 ml) intramuskulært. Suppleres med Tetanusvaccine (se 7.10).
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal rødme, hævelse, ømhed og feber ses undertiden. Allergisk shock og andre allergiske reaktioner forekommer, men sjældent.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Tetagam® P/Tetanogamma® P,Centeon).
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen immunglobulin må ikke anvendes. Må ikke anvendes, hvis væsken fremstår uklær eller klumpet.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).
<p>Tetanus antidote</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>Tetanus immune globulin is to be supplemented by a vaccine (see 7.10).</p> <p>The treatment must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.11	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Human tetanus immunoglobulin.
		<b>Form:</b>	Injection liquid 250 IU. Ampoule of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Combats poisonous substances produced by the tetanus bacteria.
		<b>Dosage:</b>	1 injection of 250 IU (1 ml) given intramuscularly. To be supplemented by the tetanus vaccine (see 7.10).
		<b>Side-effects:</b>	Local blushing, swollenness, soreness, and fever are sometimes seen.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Tetagam® P/ Tetanogamma® P, CSL Behring).
		<b>Storage:</b>	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen immune globulin must not be used. Not to be used if the liquid is muddy or lumpy.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
<p>Infektioner forårsaget af stafylokokker. Knogleinfektion</p>	7.12	<b>Lægemiddelstof:</b>	Flucloxacillin
		<b>Form:</b>	Tablet à 500 mg
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende
		<b>Dosering:</b>	750 - 1000 mg 3-4 gange dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré, hududslæt.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato. Åbne blisterpakninger 6 måneder (Heracillin, Meda AS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
<p>Infections caused by staphylococci. Infections in the bones</p>	7.12	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Flucloxacillin
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria
		<b>Dosage:</b>	750-1000 mg 3-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhea, skin rash
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production. 6 months for open blister pack(Heracillin, Meda AS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**

(continued)

Urinvejsinfektioner Lungebetændelse	7.13	<b>Lægemiddelstof:</b>	Sulfamethoxazol+trimitropri
		<b>Form:</b>	Tablet à 400 mg+80 mg
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende
		<b>Dosering:</b>	2 tabletter 2 gange dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Feber. Betændelse på tungen, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, hudkløe,
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato. (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Apotek)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.
Urinary tract infection Pneumonia	7.13	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Sulfamethoxazole+trimitroprim
		<b>Form:</b>	Tablets of 400 mg + 80 mg
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria
		<b>Dosage:</b>	2 tablets twice daily
		<b>Side-effects:</b>	Fever. Inflammation of the tongue, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, pruritus,
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Phamacy)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used during pregnancy

**Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac Medicine**

<p>Hjertekrampe Smarter i hjertet Blodprop i hjertet</p> <p>Førstehjælp: Hjertestilling (eleveret overkrop) 2 - 3 l ilt/minut Glycerylnitrat (9.1) Acetylsalicylsyre (9.3)</p> <p>Evt. for smerter: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)</p>	9.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glycerylnitrat
		<b>Form:</b>	Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.
		<b>Virkning:</b>	Udvider blodkar. Virker inden 1 minut. Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter
		<b>Dosering:</b>	Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderside. 1 pust så hurtigt som muligt efter smerters opståen. Kan gentages 1 gang. Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin
		<b>Bivirkninger:</b>	Ansigtserødem, hovedpine og kvalme. Kan sænke blodtrykket
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mm Hg systolisk. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.
<p>Angina pectoris Heart pain Coronary thrombosis</p> <p>First aid: Sit up in comfortable position 2-3 l oxygen/minute Glyceryl trinitrate (9.1) Acetylsalicylic acid (9.3)</p> <p>Possibly against pain: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)</p>	9.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Glyceryl trinitrate.
		<b>Form:</b>	Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.
		<b>Effect:</b>	Expands the blood vessels. Takes effect within 1 minute.
		<b>Dosage:</b>	The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek. 1 spray as soon as possible after the pain has occurred. May be repeated once. If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4).
		<b>Side-effects:</b>	Blushing, headache, and nausea. May cause a minor fall in blood pressure.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).
		<b>Storage:</b>	Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Control the blood pressure, which should not be below 90 mm Hg systolic. Not to be used close to open fire or embers.

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Blodfortynding  Se også 9.1	9.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Acetylsalicylsyre.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 150 mg.
		<b>Virkning:</b>	Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.
		<b>Dosering:</b>	Akut: 300 mg som tygges Vedligehold: 75 mg dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Cardiospasm Heart pain Coronary thrombosis Blood-thinning  See also 9.1	9.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Acetylsalicylic acid.
		<b>Form:</b>	Tablets of 150 mg.
		<b>Effect:</b>	Thins the blood. Prevents thrombosis.
		<b>Dosage:</b>	Acute: 300 mg has to be chewed Hereafter: 75 mg, daily
		<b>Side-effects:</b>	Increased risk of bleeding. Risk of allergic reactions. Dangerous dosage: 150 mg per kg bodyweight
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Hjertemagnyl®, Nycomed Denmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be given to ulcer patients.		
Vand i lungerne Forhøjet blodtryk	9.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Furosemid.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 40 mg.
		<b>Virkning:</b>	Tvinger væske ud af blodbanen via nyrerne til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv). Virker 1/2 time efter indtagelse. Maksimumeffekt efter 2 timer.
		<b>Dosering:</b>	Vand i lungerne: 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter. Blodtryksforhøjelse: 40 - 80 mg x 1 - 3 dagligt. (maksimalt
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .



**Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac Medicine**

(continued)

Lung edema High blood pressure	9.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Furosemide
		<b>Form:</b>	Tablets of 40 mg.
		<b>Effect:</b>	Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue). Takes effect after 1/2 hour. Maximum effect after 2 hours. Effective
		<b>Dosage:</b>	Lungedema: 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes High blood pressure: 40-80 mg once to three times daily (maximum 1500 mg/day)
		<b>Side-effects:</b>	None relevant.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents**

Brandsår	10.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Sølvulfadiazin.
		<b>Form:</b>	Creme 10 mg/g (1%).
		<b>Virkning:</b>	Forebygger hudinfektioner ved brandsår.
		<b>Dosering:</b>	Påføres i et 3 - 5 mm tykt lag 1 gang per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Hudirritation.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Flamazine®, Smith & Nephew). Tuber bør kasseres 14 dage efter åbning.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Se anvisningen i Søfartsstyrelsens Lægebog.
Burns	10.4	<b>Active pharmaceutical</b>	Silver sulfadiazine.
		<b>Form:</b>	Lotion 10 mg/g (1%).
		<b>Effect:</b>	Prevents skin infections in connection with burns.
		<b>Dosage:</b>	Apply a thin layer of 3-5 mm to the skin once a day.
		<b>Side-effects:</b>	Skin irritation.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Flamazine®, Smith & Nephew) Tubes should be discarded 14 days after opening.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . See the instructions given in the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

## Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents

Lus Fladlus Fnat	10.6	<b>Lægemiddelstof:</b>	Permethrin.
		<b>Form:</b>	Shampo 10 mg/g (1%).
		<b>Virkning:</b>	Gift, der dræber lus, fnatmider og deres æg.
		<b>Dosering:</b>	Indgnides i det renvaskede, froterede og fugtige hår og hårbund. Shampooen skal sidde i 10 minutter før den skylles ud. Døde lus og æg fjernes med tættekam, mens håret endnu er vådt. Behandlingen gentages efter 8 dage.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kløe og rødme af huden.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Se instruktionen i indlægsseddel.
Lice Crab lice Scabies	10.6	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Permethrin.
		<b>Form:</b>	Shampoo 10 mg/g (1%).
		<b>Effect:</b>	Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.
		<b>Dosage:</b>	Apply to washed, rubbed, and wet hair and scalp. The shampoo should not be rinsed off until after 10 minutes. Dead lice and eggs are removed with a fine comb while the hair is still wet. The treatment is repeated after 8 days.
		<b>Side-effects:</b>	Itching and skin blushing.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	See package leaflet.
Eksem Psoriasis Hudkløe Solskoldning Hudsvie efter insektbid	10.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glukokortikoid gruppe II
		<b>Form:</b>	Creme til udvortes brug
		<b>Virkning:</b>	Modvirker betændelsestilstande, der er fremkaldt af allergiske og toksiske årsager. Virker kløestillende og smertestillende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: Påsmøres tyndt 1-2 gange daglig.
		<b>Bivirkninger:</b>	Hudkløe brændende fornemmelse i huden, tynd hud, kontakteksem.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato. (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller fryses.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes i åbne sår.
Eczema Psoriasis Itching Sunburns Burning sensation after insect bites	10.7	<b>Active pharmaceutical</b>	Glucocorticoid group II
		<b>Form:</b>	Lotion for external use
		<b>Effect:</b>	Eases inflammations caused by allergic or toxic agents. Antipruritic and analgesic.
		<b>Dosage:</b>	Adults: Apply a thin layer to the skin 1-2 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Pruritic, burning sensation in the skin, thin skin, contact dermatitis
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. Do not refrigerate or freeze
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

## Grp. 11. Desinficerende midler / Disinfectants

Rengøring af: 1. Instrumenter FØR og EFTER brug 2. Hænder 3. Intakt hud	11.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Klorhexidin/ethanol.
		<b>Form:</b>	Væske 0,5%/85%.
		<b>Virkning:</b>	Desinficerende.
		<b>Dosering:</b>	-
		<i>Anmærkninger:</i>	Må ikke anvendes i sår, i øjne eller på slimhinder. Indeholder 85 % alkohol. Se Søfartsstyrelsens Lægebog. Alternativt indkøbes Chlorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Først anvendes Chlorhexidin, derefter Ethanol.
Disinfection of: 1. Instruments BEFORE and AFTER use 2. Hands 3. Intact skin	11.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Chlorhexidine/ethanol.
		<b>Form:</b>	Liquid 0.5%/85%.
		<b>Effect:</b>	Disinfective.
		<b>Dosage:</b>	-
		<i>Remarks:</i>	Not be used in wounds, in eyes, or on mucous membranes. Contains 85% alcohol. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual. Alternatively, Chlorhexidine 0.5% and ethanol with a minimum of 70% may be purchased in 2 separate bottles. Use chlorhexidine first and then ethanol
Førstehjælpsbehandling af urene sår Mundskylning	11.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Klorhexidin.
		<b>Form:</b>	Væske 0,2%.
		<b>Virkning:</b>	Desinficerende.
		<b>Dosering:</b>	Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning.
		<i>Anmærkninger:</i>	Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
First aid treatment of dirty wounds Mouth rinse	11.2	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Chlorhexidine.
		<b>Form:</b>	Liquid 0.2%.
		<b>Effect:</b>	Disinfective.
		<b>Dosage:</b>	May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection.
		<i>Remarks:</i>	See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

## Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Forstoppelse	12.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lactulose (disakkarid af galaktose og fruktose).
		<b>Form:</b>	Saft med 667 mg laktulose per ml.
		<b>Virkning:</b>	Den afførende virkning kan forventes efter 2 - 3 dages behandling. Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres. Fremmer den normale tarmflora. Øger tarmenes bevægelser.
		<b>Dosering:</b>	15 - 30 ml dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Luftudvikling i tarmsystemet. Oppustethed.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Favolax, Orion Corporation).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Undersøg om tilstanden skyldes en sygdom med feber eller mangel på væske FØR anvendelsen. 30 - 50 ml dagligt kan øge insulinbehovet ved
Constipation	12.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Lactulose (disaccharide of galactose and fructose).
		<b>Form:</b>	Juice with 667 mg lactulose per ml.
		<b>Effect:</b>	The laxative effect may be expected after 2-3 days treatment. Binds liquids in the intestines so that faeces are softened. Furthers normal intestinal flora. Increases the motility of the intestines.
		<b>Dosage:</b>	15-30 ml daily
		<b>Side-effects:</b>	Intestinal gas. Bloating.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Favolax Orion Corporation).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Examine whether the state has been caused by an illness accompanied by fever or a lack of liquids BEFORE use. 30-50 ml a day may increase the need for insulin in diabetic patients.
Diarré	12.6	<b>Lægemiddelstof:</b>	Loperamid.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 2 mg.
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer tarmenes bevægelser.
		<b>Dosering:</b>	Start: 2 tabletter. Pause 1 time. Derpå 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Undersøg om den syge har feber. Bør kun anvendes til børn efter <i>Radio Medicals</i> anvisninger. Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diarré hos i øvrigt upåvirkede personer.

## rp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Diarrhoea	12.6	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Loperamide.
		<b>Form:</b>	Tablets of 2 mg.
		<b>Effect:</b>	Restricts the motility of the intestines.
		<b>Dosage:</b>	Start: 2 tablets. Wait for 1 hour. 1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily
		<b>Side-effects:</b>	Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal stop.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Examine whether the patient has a fever. Should only be given to children on directions given by Radio Medical. Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected.
Mavesår	12.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Omeprazol
		<b>Form:</b>	Tablet eller kapsel 20 à mg
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer dannelsen af mavesyre
		<b>Dosering:</b>	Mavesår: 20 – 40 mg dagligt. Langtidsbehandling: 10 – 20 mg
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, luft i tarmen. Hovedpine, træthed, svimmelhed, søvnforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	4 år fra produktionsdato. (Omeprazol, Copyfarm A/S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan eventuelt kombineres med antibiotika
Stomach ulcer	12.8	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Omeprazol
		<b>Form:</b>	Tablet or capsules of 20 mg
		<b>Effect:</b>	Inhibits gastric acid secretion
		<b>Dosage:</b>	Stomach ulcer: 20-40 mg daily. Long term treatment: 10-20 mg daily.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, flatulence, headache, fatigue, dizziness, sleep
		<b>Validity:</b>	4 years from the date of production (Omeprazol, Copyfarm)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Can be combined with antibiotics.

## Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Sure opstød Halsbrand	12.9	<b>Lægemiddelstof:</b>	Antacida
		<b>Form:</b>	Tablet eller oral opløsning
		<b>Virkning:</b>	Neutraliserer mavesyre
		<b>Dosering:</b>	Jf. indlægsseddel i præparatet Efter ordination af Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Forstoppelse, diarré
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Alminox®, Nycomed Danmark)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Acid indigestion Heartburn	12.9	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Antacid
		<b>Form:</b>	Tablet or oral solution
		<b>Effect:</b>	Neutralizes acid in the stomach
		<b>Dosage:</b>	See patients information leaflet. Prescription from Radio Medical.
		<b>Side-effects:</b>	Constipation, diarrhoea
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Alminox®, Nycomed Danmark)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Hæmorider Kløe ved endetarmen Smerter ved afføring	12.10	<b>Lægemiddelstof:</b>	Antihæmoride creme (skal indeholde glucokortikoid og smertestillende middel)
		<b>Form:</b>	Salve eller creme.
		<b>Virkning:</b>	Lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse med hæmoroider og analrifter.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: Smøres på 2-3 gange daglig, samt efter afføring.
		<b>Bivirkninger:</b>	Anal slimhindeatrofi
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato. (Proctosedyl, 2care4 ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Haemorrhoids Itching at the rectum Pain during defecation	12.10	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Anti haemorrhoid ointment (Must contain glucocorticoid and analgesic)
		<b>Form:</b>	Ointment
		<b>Effect:</b>	Relief of pain, swelling and burning sensation / itching associated with haemorrhoids, anal lacerations.
		<b>Dosage:</b>	Apply 2-3 times daily and after defecation
		<b>Side-effects:</b>	Thin skin in the anus.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Proctosedyl, 2care4 ApS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

## Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Kvalme Opkastninger  MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.12	<b>Lægemiddelstof:</b>	Domperidon
		<b>Form:</b>	Tabletter à 10 mg.
		<b>Virkning:</b>	Øger mavens og tarmenes bevægelser, hvilket medfører en hurtigere tømning. Påvirker brækcenteret, hvilket medfører at kvalme og opkastninger aftager.
		<b>Dosering:</b>	10 mg max 3 gange dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Mundtørhed, døsigthed, tristhed, uro og rastløshed.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Motilium®, Janssen-Cilag).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til børn < 35 kg Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).
Nausea Vomiting  MFAG tables 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.12	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Domperidon
		<b>Form:</b>	Tablets of 10 mg.
		<b>Effect:</b>	Increases the motility of the stomach and the intestines causing a faster emptying. Affects the vomiting centre so that the nausea and vomiting decrease.
		<b>Dosage:</b>	10 mg maximum three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Dry mouth, drowsiness, sadness, and restlessness.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Motilium® Janssen-Cilag).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be given to children <35 kg. Only for short use (1 week)

## Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Svejsøjne Lokalbedøvelse af øjet  MFAG tabel 7.	13.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Cinchocain.
		<b>Form:</b>	Salve à 5 mg/g.
		<b>Virkning:</b>	Lokalbedøvende.
		<b>Dosering:</b>	1 cm salve bag nederste øjenlåg. Kan gentages efter et par minutter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Risiko for maskering af skader eller sygdomme i øjet. Forsinket sårheling.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Cincain "Optha", Ophta).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Arc eye / Welders eye Local anaesthetic of the eye  MFAG table 7	13.2	<b>Active pharmaceutical</b>	Cinchocaine.
		<b>Form:</b>	Ointment of 5 mg/g.
		<b>Effect:</b>	Local anaesthetic.
		<b>Dosage:</b>	Apply 1 cm of ointment behind the lower eyelid. May be repeated after a couple of minutes.
		<b>Side-effects:</b>	Risk of masking injuries or diseases in the eye. Delayed healing of wounds.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Cinchaine, "Ophta", Ophta).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.
Grøn stær: Smerter i øjet, Regnbuesyn Tågesyn	13.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Pilocarpin.
		<b>Form:</b>	Dråber à 20 mg/ml.
		<b>Virkning:</b>	Nedsætter trykket i det indre øje.
		<b>Dosering:</b>	Hyppig drypning bag nederste øjenlåg efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .
		<b>Bivirkninger:</b>	Sammentrækning i pupillens lukkemuskel ("knappenålsupil") og hovedpine.
		<b>Holdbarhed:</b>	1½ år fra produktionsdato (Pilocarpin "ophta" <sup>®</sup> , Ophtha A/S) Må højst anvendes 1 måned efter åbning.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Glaucoma: Pains in the eye, Rainbow vision, Blurred vision	13.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Pilocarpine.
		<b>Form:</b>	Eye drops of 20 mg/ml.
		<b>Effect:</b>	Reduces pressure inside the eye.
		<b>Dosage:</b>	Frequent drops behind the lower eyelid after prescription from <i>Radio Medical</i> .
		<b>Side-effects:</b>	Spasms of the sphincter of the pupil ("pin-hole pupil") and headache.
		<b>Validity:</b>	1½ years from the date of production (Pilocarpin "ophta" <sup>®</sup> , Ophtha A/S). To be use within 1 month, from opening the package.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.



**Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears**

(continued)

Øjenbetændelse Betændelse i øjenlåg og øjets omgivelser. Forebyggelse af betændelse efter øjenundersøgelse og fjernelse af fremmedlegemer.  MFAG appendiks 7.	13.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Fusidin
		<b>Form:</b>	Øjendråber / øjen gel 1%
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende
		<b>Dosering:</b>	1 dråbe x 2 dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Øjenirritation, øjenkløe og rødme
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato, (Fucithalamic, 2care4 ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Inflammation of the eyes. Inflammation of the eyelid, and the surroundings of the eye. Prevention of inflammation of the eyes after removal of foreign bodies.  MFAG appendiks 7	13.8	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Fusidin
		<b>Form:</b>	Eye drops / Eye gel 1 %
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria
		<b>Dosage:</b>	1 drop twice daily
		<b>Side-effects:</b>	Irritation of the eye, eye itching and blushing.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Fucithalamic, 2care4 ApS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used in connection with contact lenses
Lokal inflammatoriske øjenbehandling Øregangseksen	13.10	<b>Lægemiddelstof:</b>	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.
		<b>Form:</b>	Øjendråber 15+5+1 mg/ml
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer bakterievækst og modvirker kløe
		<b>Dosering:</b>	Øjendråber: 1 dråbe 3 gange dagligt Øredråber: 2-4 dråber 3 gange dagligt i øregange
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal irritation. Forøgelse af trykket i øjet
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb. Pfizer) Må anvendes en måned efter åbning
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical Må aldrig anvendes i øregang, dersom der er mistanke om perforeret trommehinde.
Inflammatory eye treatment Ear Eczema	13.10	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B comb.
		<b>Form:</b>	Eye drops 15+5+1 mg/ml
		<b>Effect:</b>	Inhibits bacterial growth and inhibits itching
		<b>Dosage:</b>	Eye drops: 1 drop three times a day Ear drops: 2-4 drops three times daily in the ear canal
		<b>Side-effects:</b>	Local irritation. Increasing the pressure in the eye
		<b>Validity:</b>	2 years from date of production (Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin B comb. Pfizer) May be used a month after opening
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult Radio Medical. Never use in the ear canal, where it is suspected perforated eardrum.



**Grp. 14. Gynækologiske midler / Gynaecological agents**

Blødning EFTER abort eller fødsel	14.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Methylergometrin.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 0,125 mg.
		<b>Virkning:</b>	Livmodersammentrækkende.
		<b>Dosering:</b>	Efter abort eller fødsel: 0,125 - 0,250 mg 3 gange dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslæt.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må ikke anvendes til gravide med blødninger.
Bleeding AFTER giving birth or miscarriage	14.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Methylergometrine.
		<b>Form:</b>	Tablets of 0,125 mg.
		<b>Effect:</b>	Contracts the uterus.
		<b>Dosage:</b>	After giving birth or miscarriage: 0.125-0.250 mg three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Allergy, headache, stomach ache, high blood pressure,
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used by pregnant women who are bleeding.

**Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma**

Hostestillende	15.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Dextromethorphan.
		<b>Form:</b>	Tabletter á 30 mg
		<b>Virkning:</b>	Hostestillende.
		<b>Dosering:</b>	15-30 mg. 3-4 gange daglig
		<b>Bivirkninger:</b>	Ufrivillige muskelsammentrækning, dødsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Bør ikke anvendes af børn under 6 år Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.6 og 7.7 Metronidazol. Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®)
Cough	15.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Dextromethorphan.
		<b>Form:</b>	Tablets of 30 mg
		<b>Effect:</b>	Reduces coughs.
		<b>Dosage:</b>	15 – 30 mg. 3-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Involuntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used by children under the age of 6 years Should not be used during concomitant treatment with 7.6 or 7.7 Metronidazole. Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse®)

**Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma**

**(continued)**

<p>Førstevalg ved astma og astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.</p> <p>Truende for tidlig fødsel.</p> <p>MFAG tabel 9</p>	15.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Terbutalin.
		<b>Form:</b>	Pulver i turbuhaler. 0,5 mg per dosis.
		<b>Virkning:</b>	Løsner kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
		<b>Dosering:</b>	1 dosis efter behov. Højest 6 gange dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Muskelrystelser og hurtig puls. Nældefeber. Rødt
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Bricanyl® Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Opbevares tørt.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Hvis vejrtrækningen bedres fortsæt med 4.3.
<p>First choice of medicament in case of asthma and asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.</p> <p>Imminent premature birth</p> <p>MFAG table 9</p>	15.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Terbutaline.
		<b>Form:</b>	Powder, turbuhaler. 0.5 mg per dosage.
		<b>Effect:</b>	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
		<b>Dosage:</b>	1 dose as required. Maximum six times daily
		<b>Side-effects:</b>	Muscle contractions and rapid pulse. Urticaria. Red rash.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Bricanyl®, Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be stored in a dry place.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . If respiration is improved, continue with 4.3.

Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma		(continued)	
Forkølelse Bihulebetændelse Kæbehulebetændelse Pandehulebetændelse Mellemørebetændelse	15.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Xylometazolin.
		<b>Form:</b>	Næsedråber/næsespray. 1 mg/ml.
		<b>Virkning:</b>	Skaffer afløb fra mellemøret, bihuler, pandehuler og kæbehuler. Virker øjeblikkeligt og i 10 - 12 timer.
		<b>Dosering:</b>	2 pust/dråber i hvert næsebor 2 - 3 gange dagligt i maksimum 10 dage.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ved længere tids anvendelse kan stoffet skade næsens slimhinder.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Må ikke anvendes ved symptomer på grøn stær (se 13.4).
Cold Sinusitis Maxillary sinusitis Frontal sinusitis Otitis media	15.5	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Xylometazoline.
		<b>Form:</b>	Nose drops/nose spray. 1 mg/ml.
		<b>Effect:</b>	Opens drainage from middle ears and sinuses. Takes effect immediately and stays effective for 10-12 hours.
		<b>Dosage:</b>	2 sprays/drops in each nostril two-three times daily for a maximum of ten days.
		<b>Side-effects:</b>	If used for a long period, the substance may damage the mucous membranes of the nose.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Not to be used if there are symptoms of glaucoma (see 13.4).

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			
Ernæringserstatning Væsketab  (Se også 12.7)	16.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glucose og natriumklorid.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske med glucose 25 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		<b>Virkning:</b>	Erstatter væske, glucose og salte.
		<b>Dosering:</b>	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4).

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			
Food substitute Loss of liquids  (See also 12.7)	16.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Glucose and sodium chloride.
		<b>Form:</b>	Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Replaces liquids, glucose and salts.
		<b>Dosage:</b>	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		<b>Side-effects:</b>	None relevant.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Natriumklorid- Glucose" Braun", B. Braun
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4).
2. valgs præparat ved: Blodtab Shock eller risiko for shock, når årsagen er et akut blodtab  MFAG tabel 13	16.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Hydroxyethylstivelse.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske 60 mg/ml. Beholdere à 500 ml til intravenøs anvendelse.
		<b>Virkning:</b>	Udvider plasmavolumenet svarende til den indgivne mængde.
		<b>Dosering:</b>	Efter ordination fra <i>Radio Medical</i> . Normalt ikke over 500 - 1000 ml per <i>døgn</i> . På grund af risikoen for overfølsomhedsshock indgives de første 10 - 20 ml under stor forsigtighed og nøje observation. Ved overfyldning af kredsløbet indgives Furosemid (9.4).
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergiske reaktioner. Overfølsomhedsshock.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Voluven®, Frenius Kabi).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of: Loss of blood Shock or risk of shock caused by an acute loss of blood  MFAG tabel13	16.3	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Hydroxyethyl amyloid.
		<b>Form:</b>	Infusion liquid 60 mg/ml. Containers of 500 ml for intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Enlarges the plasma volume equivalent to the amount infused.
		<b>Dosage:</b>	After ordination from <i>Radio Medical</i> . Normally, not more than 500-1000 ml a <i>day</i> . Because of the risk of allergic shock, the first 10-20 ml are infused very carefully and under close observation. If overloading including oedema of the lungs occurs: Give Furosemide (9.4).
		<b>Side-effects:</b>	Allergic reactions. Allergic shock.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Voluven®, Frenius Kabi).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			
Væske til gennemskylning af intravenøs kanyale. Sårbehandling. Øjenbehandling	16.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Natriumklorid
		<b>Form:</b>	Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder
		<b>Virkning:</b>	Fjerner blod fra venekanyale, rensesår og øjne
		<b>Dosering:</b>	Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Fluid for flushing intravenous needle. Treatment of wounds. Treatment of eyes	16.5	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Sodium chloride
		<b>Form:</b>	Fluid 0,9 % in containers of 20 ml
		<b>Effect:</b>	Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes
		<b>Dosage:</b>	See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from Radio Medical.
		<b>Side-effects:</b>	No relevant ones
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Fresenius Kabi)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

***Fortegnelse og  
kontroldokument over  
lægemiddelstoffer  
Inventory and Control  
Document  
of Active Pharmaceutical  
Ingredients***



Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B
<b>Grp. 1 Ilt / Oxygen</b>					
1.3(π)	V03AN01	Medicinsk ilt passende til A.1 (se note)	Gas	-	2 x 2 l / 200 bar
1.3(π)	V03AN01	Oxygen, Medical, suitable to A.1 (see note)	Gas	-	2 x 2 l / 200 bar
1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1					
<b>Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic</b>					
2.1(π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	10 mg/ ml	5 x 10 ml
2.1(π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Liquid	10 mg/ ml	5 x 10 ml
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	2 %	30 g
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	2 %	30 g
<b>Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics</b>					
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	500 mg	100 stk.
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	500 mg	100 pcs.
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	400 mg	30 stk.
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	400 mg	30 pcs.
3.4 (π)	N02AA01	Morfin $\Delta$	Inj. Væske	10 mg / ml	10 x 1 ml
3.4 (π)	N02AA01	Morphine $\Delta$	Inj. Liquid	10 mg / ml	10 x 1 ml
3.5(π)	N02AX02	Tramadol $\Delta$	Tablet / Kapsel	50 mg	50 stk.
3.5 (π)	N02AX02	Tramadol $\Delta$	Tablets / Capsula	50 mg	50 pcs.
<b>Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness</b>					
4.1(π)	C01CA24	Adrenalin "K"	Inj. Væske	1 mg / ml	5 x 1ml
4.1(π)	C01CA24	Epinephrine "R"	Inj. Liquid	1 mg / ml	5 x 1ml
4.2(π)	R06AX18	Acrivastine	Kapsel	8 mg	12 stk.
4.2(π)	R06AX18	Acrivastine	Capsula	8 mg	12 pcs.
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortison	Inj. pulver + væske	100 mg	1 hætteglas
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	Inj. Subst + solvens	100 mg	1 vials
4.5	N07CA02	Cinnarizin $\Delta$	Tablet	25 mg	50 stk.
4.5	N07CA02	Cinnarizine $\Delta$	Tablets	25 mg	50 pcs.
<b>Grp. 5 Antidoter / Antidotes</b>					
5.1(π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	0,4 mg /ml	5 x 1 ml
5.1(π)	V03AB15	Naloxone	Inj. Liquid	0,4 mg /ml	5 x 1 ml
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "K" (se note)	Inj. pulver + væske	1 mg	0
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "R" (see note)	Inj. Subst + solvens	1 mg	0
5.2: 1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge / 1 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.					
<b>Grp. 6 Akut sindssyge og kramper / Mental disorder and convulsion</b>					
6.2(π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Tablet	5 mg	25 stk.
6.2(π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Tablets	5 mg	25 pcs.
6.3(π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Klyasma	5 mg / ml	5 x 2½ ml
6.3(π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Enema	5 mg / ml	5 x 2½ ml
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol $\Delta$	Inj. Væske	5 mg / ml	5 x 1 ml
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol $\Delta$	Inj. Liquid	5 mg / ml	5 x 1 ml
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem $\Delta$	Tablet	10 mg	10 stk.
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem $\Delta$	Tablets	10 mg	10 pcs.

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B
<b>Grp. 7 Infektioner / Infections</b>					
7.1(π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	660 - 800 mg	100 stk.
7.1(π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	660 - 800 mg	100 pcs.
7.4(π)	J01FA01	Erythromycin	Tablet	500 mg	30 stk.
7.4(π)	J01FA01	Erythromycin	Tablets	500 mg	30 pcs.
7.7(π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	500 mg	20 stk.
7.7(π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	500 mg	20 pcs.
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	250 mg	20 stk.
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	250 mg	20 pcs.
7.10(π)	-	Tetanus holdig vaccine "K"	Inj. Væske	-	1 stk.
7.10(π)	-	Vaccine containing Tetanus "R"	Inj. Liquid	-	1 pc.
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	250 IU.	1 x 1 ml
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	250 IU.	1 x 1 ml
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	500 mg	50 stk
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	500 mg	50 pcs
7.13(π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+ trimitroprim	Tablet	400 / 80 mg	24 stk.
7.13(π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+ trimitroprim	Tablets	400 / 80 mg	24 pcs.
<b>Grp. 9 Hjerne / Cardiac</b>					
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund pray	0,4 mg/dose	1x200 doser
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/dose	1x200 doses
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	150 mg	100 stk.
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablets	150 mg	100 pcs.
9.4(π)	C03CA01	Furosemid	Tablet	40 mg	50 stk.
9.4(π)	C03CA01	Furosemide	Tablets	40 mg	50 pcs.
<b>Grp. 10 Hud / Skin</b>					
10.4	D06BA01	Sølvulfadiazin	Creme	1%	50 g
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion/Cream	1%	50 g
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Creme	Gruppe II	30 g
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion/Cream	Group II	30 g
<b>Grp. 11 Desinficering / Disinfectants</b>					
11.1	-	Klorhexidin/ethanol (se note)	Væske	0,5/85%	175 ml
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol (see note)	Liquid	0.5/85%	175 ml
11.2	-	Klorhexidin	Væske	0.2 %	4 x 250 ml
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	0.2 %	4 x 250 ml
<b>11.1:</b> Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1					

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B
<b>Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal</b>					
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	667 mg/ml	100 ml
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	667 mg/ml	100 ml
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	2 mg	10 stk.
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	2 mg	10 pcs.
12.8(π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet/Kapsel	20 mg	28 stk.
12.8(π)	A02BC01	Omeprazole	Tablets/Capsula	20 mg	28 pcs.
12.9	A02A	Antacida	Tablet eller oral opløsning	-	20 stk. eller 250 ml
12.9	A02A	Antacid	Tablets or oral solution	-	20 pcs. or 250 ml
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)	Crema/Salve	-	30 g
12.10	C05A	Anti hæmorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)	Lotion/Ointment	-	30 g
12.12(π)	A03FA03	Domperidon	Tablet	10 mg	30 stk.
12.12(π)	A03FA03	Domperidone	Tablets	10 mg	30 pcs.
<b>Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears</b>					
13.2(π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	0,50%	2 x 1g
13.2(π)	S01HA06	Cinchocaine	Ointment	0,50%	2 x 1g
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2%	10 ml
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2%	10 ml
13.8(π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	1%	2 x 5g
13.8(π)	S01AA13	Fusidin	Eye drops / gel	1%	2 x 5g
13.10(π)	S03CA04	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.	Dråber	15+5+1 mg/ml	5 ml
13.10(π)	S03CA04	Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B Comb	Drops	15+5+1 mg/ml	5 ml
<b>Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology</b>					
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	0,125 mg	10 stk.
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	0,125 mg	10 pcs.
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord./ shall only be available IF women on board.					
<b>Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold</b>					
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	20 stk.
15.1	R05DA09	Dextromethorphane	Tablets	30 mg	20 pcs.
15.2(π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doser
15.2(π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doses
15.5(π)	R01AA07	Xylometazoline	Dråber / spray	1 mg / ml	10 ml
15.5(π)	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	1 mg / ml	10 ml
<b>Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)</b>					
16.2(π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	3 x 1 liter
16.2(π)	B05BB02	Glucose + sodium chloride	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	3 x 1 litre
16.3(π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	60 mg/ml	500 ml
16.3(π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	60 mg/ml	500 ml
16.5(π)	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	0.9 %	20 x 20 ml
16.5(π)	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder / Infusion liquids may not be in glass container					





**Fortegnelse og kontroldokument  
over medicinsk udstyr**

**Inventory and Control Document  
of Medical Equipment**

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B
<b>A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment</b>		
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)	1 sæt
A.1	Mobile resuscitation equipment (see note)	1 set
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	1 stk.
A.5	Guidel airway, size 3	1 pc.
A.8	Kraftig klædesaks	1 stk.
A.8	Strong scissors for clothes	1 pc.
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	1 stk.
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	1 pc.
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	1 stk.
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	1 pc.
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	1 stk.
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	1 pc.
A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1		
<b>B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape</b>		
B.2	Sterile gaze kompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	10 stk.
B.2	Sterile gaze compress, approx. 10x10 cm, approx. 8 layers	10 pcs.
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	3 stk.
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	3 pcs.
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"	10 stk.
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"	10 pcs.
B.6	Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	1 stk.
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive, approx. 10 x 10 cm	1 pc.
B.7	Gazeviskers, usterile	100 stk.
B.7	Gauze swaps, non-sterile	100 pcs.
B.8	Tube gaze til fingerforbindinger	2 stk.
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	2 pcs.
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m	5 ruller
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m	5 rolls
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	1 pakke
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	1 pack
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	2 pakker
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	2 packs
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	1 rulle
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	1 roll
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	1 rulle
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	1 roll

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B
<b>C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation</b>		
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	20 stk.
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	20 pcs.
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	20 stk.
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	20 pcs.
C.5	Vaskesvampe, éngangs	25 stk.
C.5	Bath sponge, disposable	25 pcs.
C.6	Beskyttelsesbriller	1 stk.
C.6	Protective goggles	1 pc.
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	2 stk.
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	2 pcs.
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	250 ml
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	250 ml
<b>D. Sårbehandling / Treatment of wounds</b>		
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	10 stk
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	10 pcs.
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	6 stk.
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	6pcs.
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18 x 9 x 3 cm	1 stk.
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x3 cm	1 pc.
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pc.
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	1 stk.
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	1 pc.
D.11	Splintpincet	1 stk.
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	1 pc.
D.12	Pean, krum	1 stk.
D.12	Pean, curved	1 pcs.
D.13	Nåleholder	1 stk.
D.13	Suture - holder	1 pcs.
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	1 stk.
D.14	Safety razor, disposable single use	1 pcs.
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	4 stk.
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	4 pcs.



Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B
<b>E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion</b>		
E.1	Kanylebøtte	1 stk.
E.1	Box for contaminated needles	1 pc.
E.2	Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%	50 stk.
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%	50 pcs.
E.3	Staserem	1 stk.
E.3	Torniquet	1 pcs.
E.4	Optiva*2, intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	5 stk.
E.4	Optiva*2, intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	5 pcs.
E.5	Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle	5 stk.
E.5	Vecafix®, fixing plaster for intravenous needle	5 pcs.
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	10 stk.
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	10 pcs.
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	5 stk.
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	5 pcs.
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	5 stk.
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	5 pcs.
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	2 stk.
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	2 pcs.
<b>F. Udstyr til medicinskundersøgelse / Equipment for medical examination</b>		
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pc.
F.2	Stetoskop	1 stk.
F.2	Stethoscope	1 pc.
F.3	Digitalt lægetermometer	1 stk.
F.3	Digital clinical thermometer	1 pc.
F.4	Pencillygte m. batterier	1 stk.
F.4	Pencil lamp w/batteries	1 pc.
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	5 stk.
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	5 pcs.
F.6	Pandelampe	1 stk.
F.6	Head lamp	1 pc.
<b>H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment</b>		
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	1 stk.
H.1	Lamp with UV light w/batteries	1 pc.
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	10 stk.
H.2	Fluorescent colour for the eye	10 pcs.
H.3	Vatpinde, sterile	20 stk.
H.3	Cotton sticks, sterile	20 pcs.
H.5	Øjenklap	1 stk.
H.5	Eye patch	1 pcs.
H.6	Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	4 stk.
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	4 pcs.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B
<b>I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder</b>		
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	2 stk.
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	2 pcs.
I.2	Urinkelbe, plastic	1 stk.
I.2	Bed bottle, plastic	1 pc.
<b>J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures</b>		
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	1 stk.
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	1 pc.
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	1 stk.
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	1 pcs.
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	1 stk.
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	1 pc.
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	2 stk.
J.4	Triangular scarf (Mitella)	2 pcs.
J.5	Sikkerhedsnåle	12 stk.
J.5	Safety pins	12 pcs.
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	2 stk.
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	2 pcs.
J.10	Fikseringsplaster, "Tensoplast", ca. 2 cm x 2m	1 rulle
J.10	Adhesive tape, "Tensoplast", approx. 2 cm x 2m	1 roll
<b>K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation</b>		
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	1 stk.
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	1 pc.
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	1 stk.
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	1 pc.
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	1 stk.
K.4	Stiff neck collar, adjustable	1 pc.
<b>M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing</b>		
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	10 stk.
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	10 pcs.
<b>O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.</b>		
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for søfarende	1 stk.
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth	1 pc.
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B	1 stk.
O.3	Inventory, Control document and Userinstruction Category B	1 pc.
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.
O.5	Radio Medical Records	1 pc.
<b>O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.</b> <b>O.3 must be available in digital or printed version.</b>		

# Labels

<p>1.1 - 1.3 Gas / Gas  <b>Medicinsk ilt / Medical Oxygen</b>  Indikation / Indication: Bevidstløse uden vejtrækning, Bevidstløse med vejtrækning, Medtaget almen tilstand.  Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejtrækningsbesvær / Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing.  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperatur under 50°C / Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C</p>
<p>2.1 inj. væske / inj. liquid  <b>Lidocain 10 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>2.2 gel / gel  <b>Lidocain 2%</b>  Indikation/Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.1 tablet / tablet  <b>Paracetamol 500 mg</b>  Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain; MFAG tables 7, 8,13  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.2 tablet / tablet  <b>Ibuprofen 400 mg</b>  Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.4 inj.væske / inj.liquid Δ  <b>Morfin 10 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; MFAG tables 7,8, 10,13  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.5 kapsel / capsule Δ  <b>Tramadol 50 mg</b>  Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.1 inj.væske / inj.liquid  <b>Adrenalin 1 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: 2– 8°C</p>
<p>4.2 kapsel / capsule  <b>Acrivastin 8 mg</b>  Indikation / Indication: Allergi / Allergy  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.3 inj.væske / inj.liquid  <b>Hydrocortisonsuccinat 100 mg/2 ml</b> Indikation / Indication: Allergi / Allergy  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>4.5 tablet / tablet Δ  <b>Cinnarizin 25 mg</b>  Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>5.1 inj.væske / inj.liquid  <b>Naloxone 0,4 mg/ml</b>  Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote  MFAG tables 4, 13  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.2 tablet / tablet Δ  <b>Diazepam 5 mg</b>  Indikation / Indication: Angst / Anxiety  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.3 klysma / enema Δ  <b>Diazepam 5 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Kræmper / Convulsions; MFAG tables 4, 5, 6  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.4 inj.væske / inj liquid Δ  <b>Haloperidol 5 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Sindsyge / Mental disease  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.5 tablet / tablet Δ  <b>Zolpidem 10 mg</b>  Indikation / Indication: Søvnløshed / insomnia  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.1 tablet / tablet  <b>Phenoxymethylpenicillin 660 - 800 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.4 tablet / tablet  <b>Erythromycin 500 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 9  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.7 suppositorie / suppository  <b>Metronidazol 500 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.8 tablet / tablet  <b>Ciprofloxacin 250 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.10 vaccine / vaccine  <b>Tetanus holdig vacc/ Vacc. containing tetanus</b>  Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkræmpe / Tetanus prevention  Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>

<p>7.11 immunglobulin / immunglobuline  <b>Tetanus 250 IE/ml</b>  Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>
<p>7.12 tablet / tablet  <b>Flucloxacillin 500 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.13 tablet / tablet  <b>Sulfamethoxazol+trimitroprim 400mg + 80 mg</b>  Indikation / Indication: Infektioner / Infections  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.1 spray / aerosol  <b>Glycerylnitrat 0,4 mg/dose</b>  Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: 2 - 25°C</p>
<p>9.3 tablet / tablet  <b>Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid 150 mg</b>  Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.4 tablet / tablet  <b>Furosemid 40 mg</b>  Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.4 creme / cream  <b>Sølvulfadiazin / Silver sulfadiazine 1%</b>  Indikation / Indication: Brandsår / Burns  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.6 shampoo / shampoo  <b>Permethrin 1%</b>  Indikation / Indication: Lus / Lice  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.7 creme / lotion  <b>Glukokortikoid gruppe II /glucocorticoid group II</b>  Indikation / Indication: Eksem / Eczema  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>11.1 væske / liquid  <b>Chlorhexidin / Ethanol 0,5%/85%</b>  Indikation / Indication: Desinfektion af instrumenter / Disinfection of instruments  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>11.2 væske / liquid  <b>Chlorhexidin 0,2%</b>  Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse.  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>12.5 væske / liquid  <b>Lactulose 667 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.6 tablet / tablet  <b>Loperamide 2 mg</b>  Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.8 kapsler / capsule  <b>Omeprazol 20 mg</b>  Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.9 tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution  <b>Antacida</b>  Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.10 rektalsalve / rectal ointment  <b>Hæmoride creme / Anti hæmorrhoid agent</b>  Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruitis Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: &lt; 25 C</p>
<p>12.12 Tablet / Tablet  <b>Domperidon 10 mg</b>  Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>
<p>13.2 øjensalve / eyeointment  <b>Cinchocain 5 mg/g</b>  Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye;  M FAG table Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.4 øjendråber / eyedrops  <b>Pilocarpin 20 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.8 øjendråber / eyedrops  <b>Fusidinsyre 10mg/g i/in 5g tube</b>  Indikation: Øjeninflammation / Inflammation of eye  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur</p>
<p>13.10 øjendråber / eyedrops  <b>Hydrocortison med/with Terramycin® og Polymyxin-B Comb</b>  Indikation / Indication: Øjeninflammation / Inflammation of eye  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>14.2 tablet / tablet  <b>Methylergometrin 0,125 mg</b>  Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>15.1 Tablet / Tablet  <b>Dextromethorphan</b> 30 mg  Indikation / Indication: Hoste / Cough  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.2 turbuhaler / turbuhaler  <b>Terbutalin</b> 0,5 mg/dose  Indikation / Indication: Astma / Asthma  MFAG table 9  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops  <b>Xylometazolin</b> 1 mg/ml  Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>16.2 inf.væske / inf.liquid  <b>Glucose og natrium / glucose and sodium</b> 25/4,5 mg/ml  Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>16.3 inf.væske / inf.liquid  <b>Hydroxyethylstivelse/hydroxyethyl amyloid</b> 60 mg/ml  Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood / MFAG app. 13  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>16.5 Inj. væske / inj.liquid  <b>Natriumklorid / sodium chloride</b> 9 mg/ml  Indikation / Indication: Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes  Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

# INDEX

Abdominal infections	25	Cinchocaine.	39
Abstinenskrammer	21	Cinnarizin	19
Acetylsalicylic acid.	31	Ciprofloxacin	26
Acetylsalicylsyre	31	Ciprofloxacin	26
Acid indigestion	37	Cold	44
Acrivastin	17	Constipation	35
Acrivastine	17	Convulsions	21
Acute diarrhoea	26	Convulsions , universal	22
Acute mental disease	21	Convulsions, poisoning	22
Acute mental illness	22	Convulsions, Withdrawal	22
Adrenalin	16	Coronary thrombosis	15; 30; 31
Akut diarré	26	Cough	42
Akut sindsyge	21; 22	Crab lice	33
Alcoholic withdrawal symptoms	21	Delusions	22
Alkoholabstinenser	21	Dextromethorphan.	42
Allergi	17; 18	Diarré	35
Allergic asthma	17; 18	Diarrhoea	36
Allergic face oedema	17; 18	Diazepam	21; 22
Allergic shock	16	Difficulty falling asleep	23
Allergisk ansigtsødem	17; 18	Dirty wounds, Disinfection	34
Allergisk astma	17; 18	Dislocations	21
Allergisk shock	16	Domperidon	38
Allergy	17; 18	Dysenteri	26
Angina pectoris	30	Dysentery	26
Angst	21; 22	Eksem	33
Antacid	37	Epilepsi	21
Antacida	37	Epilepsy	22
Antidote, morphine	19	Epinephrine	16
Antihæmoride creme	37	Ernæringserstatning	44
Anxiety	21; 22	Erythromycin.	24; 25
Appendicitis	25; 26	Eyes, Treatment	46
Arc eye	39	Feber	13
Asthma	43	Female reproductions organs, infection	25
Asthma-like breathing	43	Fever	13
Astma	43	Fladlus	33
Astmalignende vejtrækning	43	Flucloxacillin	28
Back pains	13	Flushing, intravenous needle	46
Bevidstløs med vejtrækning	11	Fnat	33
Bevidstløs uden vejtrækning	11	Food substitute	45
Bihulebetændelse	24; 44	Forbrændinger	14
Bleeding, after birth	42	Forhøjet blodtryk	31
Bleeding, miscarriage	42	Forkølelse	44
Blindtarmsbetændelse	25; 26	Forstoppelse	35
Blodfortynding	31	Fractures	14; 15; 21
Blodprop i hjertet	14; 30; 31	Frontal sinusitis	44
Blodtab	45	Furosemid	31
Blood-thinning	31	Furosemide	32
Blurred vision	39	Fusidin	40
Blødning, abort	42	Galdesten	14
Blødning, fødsel	42	Gall stone	15
Boil in the throat	26	Gennemskylning, intravenøskanyle	46
Bone-ache	14	Glaucoma	39
Bones, infections	28	Glucagon	20
Brandsår	32	Glucocorticoid group II	33
Breathing difficulties	11	Glucose and sodium chloride.	45
Brud	21	Glucose og natriumklorid.	44
Brugervejledning Lægemiddelstoffer	10	Glukokortikoid gruppe II	33
Burning sensation, skin	33	Glyceryl trinitrat	30
Burns	15; 32	Glycerynitrat	30
Cardiospasm	31	Gonoré	26
Chlamydia	24; 25	Gonorrhoea	26
Chlorhexidin.	34	Grøn stær:	39
Chlorhexidine/ethanol.	34	Haemorrhoids	37
Cholera	26	Hallucinationer.	22
Cinchocain.	39	Hallucinations.	22



Haloperidol	22	Kvalme og opkastninger	22
Haloperidole.	22	Kvæstelser	14
Halsbetændelse	24	Kæbehulebetændelse	44
Halsbrand	37	Lactulose	35
Halsbyld	25; 26	Lavt blodsukker	20
Hands, Disinfection	34	Ledskred	21
Hay fever	17	Ledsmerter	13
Headache	13	Legionella	24; 25
Heart pain	30; 31	Lette til moderate smerter	15
Heartburn	37	Lice	33
High blood pressure	32	Lidocain	11; 12
Hjertekrampe	30; 31	Lidocaine	12
Hostestillende	42	Local anaesthetic, eye	39
Hovedpine	13	Local anaesthetics	12
Hudkløe	33	Lokal inflammatoriske øjenbehandling	40
Hudsvie	33	Lokalbedøvelse	11; 12
Human tetanus immunoglobulin	28	Lokalbedøvelse, øjet	39
Humant tetanus immunoglobulin	28	Loperamid	35
Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.	40	Loperamide.	36
Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B comb.	40	Loss of blood	45
Hydrocortison.	18	Loss of liquids	45
Hydrocortisonsuccinate	18	Low blood sugar	20
Hydroxyethyl amyloid.	45	Lung edema	32
Hydroxyethylstivelse.	45	Lungebetændelse	24; 29
Hypoglycaemic coma	20	Lungepest	26
Hæmorider	37	Lus	33
Hænder, desinficering	34	Major wounds	15
Høfeber	17	Mani, vildskab	22
Ibuprofen.	13; 14	Mania, wildness	22
Imminent premature birth	43	Mavesår	36
Indsovningsbesvær	23	Mavesårsinfektioner	24
Infection, Urinary tract	29	Maxillary sinusitis	44
Infections, oral cavity	24; 25	Medical oxygen	11
Infections, stomachulcer	25	Medicinsk ilt.	11
Infektioner, stafylokokker	28	Medtaget almen tilstand	11
Inflammation, eye	40	Mellemørebetændelse	24; 44
Inflammation, middle ear	24; 25	Menstruationssmerter	13
Inflammation, throat	24	Mental restlessness	22
Inflammatory eye treatment	40	Methylergometrin.	42
Injuries	15	Methylergometrine.	42
Insect bites	33	Metronidazol.	25
Insektbid	33	Moderate pains:	14
Insomnia	23	Moderate smerter:	13
Instrumenter, desinficering	34	Modgift, morfin	19
Instruments, Disinfection	34	Morfin	14
Insulin shock	20	Morphine	15
Insulinshock	20	Motoric restlessness,	22
Insulintilfælde	20	Motorisk uro	22
Intact skin, Disinfection	34	Mouth rinse	34
Intakt hud, desinficering	34	Mundhuleinfektioner	24
Intestinal infections	25	Mundskylning	34
Itching, rectum	37	Muscle pains	14
Kidney stone	15	Muskelsmerter	13
Klorhexidin.	34	Naloxon	19
Klorhexidin/ethanol.	34	Naloxone	19
Kløe, endetarmen	37	Natriumklorid	46
Kløestillende	12	Nausea	38
Knoglebrud	13	Nausea and vomiting	22
Knogleinfektion	25; 28	Nyrebækkenbetændelse	26
Knoglesmerter	13	Nyresten	14
Kolera	26	Nældefeber	17
Kramper	21	Omeprazol	36
Kramper, forgiftninger	21	Opkastninger	38
Kramper, universelle	21	Otitis media	44
Kvalme	38	Oxygen	11

Pain during defecation	37	Tramadol	15
Pain in joints	14	Truende for tidlig fødsel.	43
Pains, eye	39	Tågesyn	39
Pandehulebetændelse	44	Udsættende vejtrækning	19
Paracetamol	13	Unconscious with breathing	11
Paracetamol.	13	Unconscious without breathing	11
Period pains	14	Underlivsinfektioner	25
Permethrin.	33	Urene sår, desinficering	34
Phenoxymethylpencillin	24	Urethritis	26
Phenoxymethylpenicillin	24	Urinrørsbetændelse	26
Pilocarpin	39	Urinvejsinfektioner	29
Pilocarpine	39	uroilstande	21
Pneumonia	24; 25; 29	Urticaria	17
Pneumonic plague	26	User instruction Active Pharmaceutical Ingredients	10
Psoriasis	33	Vand i lungerne	31
Psykisk uro	22	Vejtrækningsbesvær	11
Pyelitis	26	Vomiting	38
Rainbow vision	39	Vrangforestillinger	22
Regnbuesyn	39	Væsketab	44
Relieves itching	12	Weak general condition	11
Restlessness	21	Weak pains:	13
Rygsmarter	13	Weak to moderate pain	15
Scabies	33	Welders eye	39
Seasickness	19	Wounds, Treatment	46
Severe bronchitis	26	Xylometazolin.	44
Severe injuries	11	Xylometazoline.	44
Severe pain	15	Zolpidem	23
Shock	45	Ændringer/ Changes	74
Silver sulfadiazine	32	Øjenbehandling	46
Sinusitis	24; 25; 44	Øjenbetændelse	40
Smerter i hjertet	30; 31	Øregangseksen	40
Smerter, afføring	37		
Smerter, øje	39		
Sodium chloride	46		
Solskoldning	33		
Staphylococci	28		
Stivkrampemodgift	28		
Stivkrampevaccine	27		
Stomach ulcer	36		
Stops breathing	19		
Store sårskader	14		
Stærke smerter:	14		
Større kvæstelser	11		
Sulfamethoxazol+trimitroprim	29		
Sulfamethoxazole+trimitroprim	29		
Sunburns	33		
Sure opstød	37		
Suture of wounds	12		
Svage smerter	13		
Svejseøjne	39		
Svær bronkitis	26		
Syning af sår	11		
Sølvulfadiazin	32		
Søsyge	19		
Søvnløshed	23		
Sårbehandling.	46		
Tandbyld	25; 26		
Tarminfektioner	25		
Terbutalin	43		
Terbutalin.	43		
Tetanus antidote	28		
Tetanus holdig vaccine	27		
Tetanus vaccine	27		
tetanustoxid	27		
Tooth abscess	26		

**Rekvisition lægemidler og udstyr**  
**Requisition Active pharmaceutical Ingredient and equipment**

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
1.3	V03AN01	Ekstra iltflaske	Gas	
1.3	V03AN01	Spare oxygen cylinder	Gas	
2.1 (π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	
2.1 (π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Væske	
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	
3.4 (π)	N02AA01	Morfin $\Delta$	Inj. Væske	
3.4 (π)	N02AA01	Morphine $\Delta$	Inj. Liquid	
3.5 (π)	N02AX02	Tramadol $\Delta$	Tablet / Kapsel	
3.5 (π)	N02AX02	Tramadole $\Delta$	Tablest / Capsula	
4.1 (π)	C01CA24	Adrenalin "K"	inj. Væske	
4.1 (π)	C01CA24	Epinephrine "R"	inj. Liquid	
4.2	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	
4.2	R06AX18	Acrivastine	Capsula	
4.3 (π)	H02AB09	Hydrocortison	Inj. Tørstof + væske	
4.3 (π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	inj. Subst + solvens	
4.5 (π)	N07CA02	Cinnarizin $\Delta$	Tablet	
4.5 (π)	N07CA02	Cinnarizine $\Delta$	Tablets	
5.1 (π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	
5.1 (π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "K"	Inj. Tørstof + væske	
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	
6.2 (π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Tablet	
6.2 (π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Tablets	
6.3 (π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Klyasma	
6.3 (π)	N05BA01	Diazepam $\Delta$	Enema	
6.4 (π)	N05AD01	Haloperidol $\Delta$	Inj. Væske	
6.4 (π)	N05AD01	Haloperidole $\Delta$	Inj. Liquid	
6.5 (π)	N05CF02	Zolpidem $\Delta$	Tablet	
6.5 (π)	N05CF02	Zolpidem $\Delta$	Tablets	
7.1(π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	
7.1 (π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	
7.4 (π)	J01FA01	Erythromycin	Tablet	
7.4 (π)	J01FA01	Erythromycin	Tablets	
7.7 (π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	
7.7 (π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	
7.8 (π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	
7.8 (π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	
7.10 (π)	-	Tetanus vaccine "K"	Inj. Væske	
7.10 (π)	-	Tetanus vaccine "R"	Inj. Liquid	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablet	
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablets	
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund pray	
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablets	
9.4 (π)	C03CA01	Furosemide	Tablet	
9.4 (π)	C03CA01	Furosemide	Tablets	
10.4	D06BA01	Sølv sulfadiazin	Creme	
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion / Cream	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Creme	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion / Cream	
11.1	-	Klorhexidin/ethanol	Væske	
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol	Liquid	
11.2	-	Klorhexidin	Væske	
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet / Kapsel	
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazole	Tablets / Capsula	
12.9	A02A	Antacida	Tablet or oral opløsning	
12.9	A02A	Antacid	Tablets or oral solution	
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid og smertestillende middel)	Creme/Salve	
12.10	C05A	<i>Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)</i>	Lotion/ointment	
12.12 (π)	A03FA03	Domperidon	Tablet	
12.12 (π)	A03FA03	Domperidone	Tablets	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocaine	Oinment	
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Eye drops / gel	
13.10 (π)	S03CA04	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb	Dråber	
13.10 (π)	S03CA04	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B comb	Drops	
14.2 (π)	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	
14.2 (π)	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	
15.1	R05DA09	Dextromethorphane	Tablets	
15.2 (π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	
15.2 (π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	
15.4 (π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	
15.4 (π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + sodiumchlorid	Inf. Liquid	
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	
16.5 (π)	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	
16.5 (π)	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr	
A.1	Mobile resuscitation equipment	
A.4	Tungeholdere, størrelse 2	
A.4	Guidel airway, size 2	
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	
A.5	Guidel airway, size 3	
A.6	Tungeholdere, størrelse 4	
A.6	Guidel airway, size 4	
A.7	Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske	
A.7	Extra ventilation bag with valve and mask	
A.8	Kraftig klædesaks	
A.8	Strong scissors for clothes	
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	
B.2	Sterile gazeekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	
B.2	Sterile gaze compress, approx. 10 x 10 cm, approx. 8 layers	
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.6	Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm	
B.7	Gazeviskers, usterile	
B.7	Gauze swaps, non-sterile	
B.8	Tubegaze til fingerforbindinger	
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m	
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m	
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	
C.5	Vaskesvampe, éngangs	
C.5	Bath sponge, disposable	
C.6	Beskyttelsesbriller	
C.6	Protective goggles	
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x 3 cm	
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	
D.7	Surgical scissors w/straight points	
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	
D.11	Splintpincet	
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	
D.12	Pean, krum	
D.12	Pean, curved	
D.13	Nåleholder	
D.13	Suture - holder	
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	
D.14	Safety razor, disposable single use	
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	



Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
E.1	Kanylebøtte	
E.1	Box for contaminated needles	
E.2	Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%	
E.2	Alcohol swabs, isopropyl alcohol 70%	
E.3	Staserem	
E.3	Torniquet	
E.4	Optiva*2 , intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g *)	
E.4	Optiva*2 , intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g **)	
E.5	Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle	
E.5	Vecafix®, fixing plaster for intraveneos needle	
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) *)	
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) **)	
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	
F.1	Blodtryksmåler	
F.1	Instrument for measuring blood pressure	
F.2	Stetoskop	
F.2	Stethoscope	
F.3	Digitalt lægetermometer	
F.3	Digital clinical thermometer	
F.4	Pencillygte m. batterier	
F.4	Pencil lamp w/batteries	
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	
F.6	Pandelampe	
F.6	Head lamp	
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	
H.1	Lamp with UV light w/batteries	
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	
H.2	Fluorescent colour for the eye	
H.3	Vatpinde, sterile	
H.3	Cotton sticks, sterile	
H.5	Øjenklap	
H.5	Eye patch	
H.6	Øjenskyllévæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	
I.2	Urinkolbe, plastic	
I.2	Bed bottle, plastic	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	
J.4	Triangular scarf (Mitella)	
J.5	Sikkerhedsnåle	
J.5	Safety pins	
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cmx2m	
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cmx2m	
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	
K.4	Stiff neck collar, adjustable	
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	
O.1	Søfartsstyrelsens forskrifter om sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe	
O.1	Technical regulations on medical treatment and medicine on board ships issued by the Danish Maritime Authority	
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog	
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority	
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B	
O.3	Inventory, Controldocument and Userinstruction Category B	
O.5	Radio Medical Optegnelser	
O.5	Radio Medical Records	

O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer.  
O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.  
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. [www.søfartsstyrelsen.dk](http://www.søfartsstyrelsen.dk)  
O.3 must be available in digital or printed version. [www.dma.dk](http://www.dma.dk)

# Ændringer/ Changes

Oktober 2020

- 7.10 Tetanus holdig vaccine – styrke og ATC kode fjernet,  
da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical
- 7.10 Tetanus-containing vaccine – strength and ATC code removed,  
as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical

6.3 Diazepam klysma – styrke ændret til 5 mg/ml

6.3 Diazepam enema – strength changed to 5 mg/ml

Marts 2020

Ændringer er nu på sidste side  
Changes is now a the last page

- 7.1 Phenoxyethylpenicillin styrken er ændret til 660 mg - 800 mg  
Manglende note til gruppe 1.3 er tilføjet.  
Note ved O.2 er fjernet
- D.4 Sutur fjernet firma navn.

- 7.1 Phenoxyethylpenicillin strength change to 660 mg - 800 mg  
Missing note group 1.3 added.  
Notes to O.2 removed.
- D.4 Sutur removed company name

November 2017

- 7.10 Tetanus vaccine ændre til Tetanusholdig vaccine
- 7.10 Tetanus vaccine change to Vaccine containing Tetanus.

August 2017

- O.2 Tilføjet nye lægebog fra Seahealth
- O.2 Add. new medical guide from Seahealth