

# Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B – MFAG B

## Inventory, Control Document and User Instructions Category B – MFAG B

# **Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori B MFAG B**

Jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B

# **Inventory, Control Document and User Instructions of Active Pharmaceutical Ingredients and Medical Equipment Category B MFAG B**

Cf. Danish Maritime Authority Notice A, chapter IX B

Marts 2020

ISBN: 978-87-7454-214-8

# Medicin certifikat / Medicine Certificate

## Medicin certifikat / Medicine Certificate

Dette dokument anses for at udgøre skibets medicin certifikat.

Det attesteres herved, at medicin og medicinsk udstyr er efterset og fundet i overensstemmelse med  
Den Danske Søfartsstyrelsес krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

This document is considered to represent the ships certificate of medicine.

*It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the  
Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.*

Skibsnavn / Ship Name:

Kaldesignal / Call Signal:

IMO nummer / IMO Number:

Hjemmehavn / Port of Reg.:

Dato /Date	Rank / Rank	Navne / Name	Underskrift / Signature
	Skibsfører / Master		

Næste eftersyn / Next inspection			
Dato /Date	Rank / Rank	Navne / Name	Underskrift / Signature
	Skibsfører / Master		

# Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1)

## *Certificate resuscitation equipment (A.1)*

Det attesteres herved at det **mobile genoplivningsudstyr (A.1)** er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelsес krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

It certifies that the **mobile resuscitation equipment (A.1)** has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato /Date	Rank / Rank	Navne / Name	Underskrift / Signature
	Skibsfører / Master		

Næste eftersyn / Next inspection			
Dato /Date	Rank / Rank	Navne / Name	Underskrift / Signature
	Skibsfører / Master		

## Indhold / Contents

Bruger guide – User Guide .....	5
Anvendte forkortelser – Used abbreviations .....	9
Brugervejledning Lægemidler – User Instruction Activ Pharmaceutical Ingredients .....	10
Fortegnelse over Lægemidler - Inventory of Activ Pharmaceutical Ingredients .....	53
Besætningens medbragte medicin - Crew member's private medicine.....	58
Fortegnelse over Medicinsk udstyr - Inventory of Medical equipment .....	60
Etiketter Lægemidler – Labels Activ Pharmaceutical Ingredients.....	66
Indeks – Index .....	70
Rekvizition – Lægemidler - Requisition - Active Pharmaceutical Ingredients.....	75
Rekvizition - Medicinsk udstyr - Requisition - Medical Equipment .....	79

## De Danske Medicinkister

Medicinkisten angiver medicin/medicinsk udstyr, som Radio Medical Danmark og Søfartsstyrelsen har foretrukket indenfor de rammer som EU-direktiv 92/29/EØF og den Danske lægemiddelstyrelse har givet.

### Guide til:

#### Brugervejledning:

**Første kolonne** beskriver de indikationer, lægemiddelstoffet er beregnet til. De samme indikationer kan slås op i indekset bagerst i publikationen. Første kolonne beskriver også om et lægemiddelstof skal anvendes sammen med andre lægemiddelstoffer. I sådanne tilfælde er der lavet henvisninger til de relevante lægemiddelstoffer.

I samme kolonne gøres opmærksom på, om lægemiddelstoffet udgør en del af MFAG (Medical First Aid Guide) der refereres i så fald til den relevante MFAG tabel.

MFAG's lægemiddelstofferne er defineret i IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koden, supplementsdelen, seneste version og indarbejdet i denne version af den danske "Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning".

**Bemærkning:** Sejlads med farligt gods jævnfør IBC koden, INF koden og IGS koden er ikke indarbejdet i denne publikation. Der henvises til disse publikationer.

**Anden kolonne** oplyser, Lægemiddelstoffs hoved- og undergruppenummer.

**Tredje og fjerde kolonne** indeholder rækker med oplysninger om:

- **Lægemiddelstoffet:** Beskriver det aktive stof i lægemidlet. Som et eksempel kan nævnes 3.1 Paracetamol. Det forhandles over hele jorden under mange forskellige handelsnavne. Derfor kan man uanset forskellige handelsnavne, altid finde lægemidlet, hvis man kender lægemiddelstoffet.
- **Form:** Beskriver om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klysma, oral opløsning eller inhalation. Form beskriver også styrken af det enkelte lægemiddelstof pr ml eller per tablet.
- **Virkning** beskriver den forventende virkning af det enkelte lægemiddel.
- **Dosering** beskriver den anbefalede dosis ved de tilstande, der er beskrevet i kolonnen indikation. Her beskrives ligeledes lægemidlets form og administrationsmåde.
- **Bemærkning:** Radio Medical kan ordinere andre doser og administrations måder.
- **Bivirkninger** nævner de mest almindelige bivirkninger beskrevet i Dansk Lægemiddelinformation, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk)
- **Holdbarhed** beskriver holdbarhedstiden fra produktions dato. Holdbarhedstiden beskrevet i denne fortægnelse er fremkommet ud fra det danske handelsnavn med længst holdbarhed.
- **Bemærkning:** Der tages forbehold for at holdbarhedstiden kan ændres.
- **Opbevaring** beskriver om der er særlige krav til opbevaring. Lægemidler skal generelt opbevares tørt og beskyttet mod lys. De fleste lægemidler tåler "almindelig temperatur" defineret som normal stuetemperatur op til 22-24° C.
- **Anmærkninger** beskriver, om der bør søges samråd med Radio Medical Danmark inden anvendelse af lægemiddelstoffet. Desuden beskrives, om der er specielle forholdsregler til det specifikke lægemiddelstof.
- **Advarsel:** Lægemiddelstoffer, der har været opbevaret forkert, eller er blevet for gamle, kan være sundhedsskadelige.

## The Danish Medicine Chest's

The medicine chest indicates the Active Pharmaceutical Ingredients / medical equipment that Radio Medical Denmark and Danish Maritime Authority have preferred within the framework of the EU Directive 92/29 / EEC and the Danish Medicines Agency.

### Guide to:

#### User instruction:

**First column** describes the indication the Active Pharmaceutical Ingredients is intended for. The same indications can be looked up in the index at the back of the publication. First column also describes whether an Active Pharmaceutical Ingredient should be used together with other Active Pharmaceutical Ingredients. In such cases, a reference is made to the relevant Active Pharmaceutical Ingredient. In the same column it is noted if the Active Pharmaceutical Ingredients is part of MFAG (Medical First Aid Guide) and reference to the relevant MFAG table is made. MFAG Active Pharmaceutical Ingredients are defined in the IMDG (International Maritime Dangerous Goods) code, supplement component, latest edition, and incorporated in this version of the Danish "Inventory, control document and user manual".

**Note:** Sailing with dangerous goods as per the IBC code, INF code and the IGC code are not included in this publication. Please refer to these publications.

**Second column** describes the Active Pharmaceutical Ingredient main and subgroup numbers.

**Third and fourth column** contains rows with information about:

- **The Active Pharmaceutical Ingredients:** describe the Active Pharmaceutical Ingredients in the medicine. An example is 3.1 Paracetamol, which is sold all over the world under many different trade names. Regardless of different trade names it is always possible to locate the medicine, if you know the Active Pharmaceutical Ingredients.
  - **Form:** describes if the Active Pharmaceutical Ingredients is available as capsules, tablets, suppositories, injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation. Form also describes the strength of each active pharmaceutical ingredient per ml or per tablet.
  - **Effect** describes the expected effect of each Active Pharmaceutical Ingredients.
  - **Dosage** describes the recommended dose for the condition described in the column indication. The form of the Active Pharmaceutical Ingredients as well as the usual administration is mentioned.
  - **Side effects** describes the most common side effects mentioned in the Danish Drug Information, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk). There is currently no English version.
  - **Durability** describes the time of durability from date of production. The durability mentioned in this record is derived from the Danish trade name with the longest durability.
  - **Storage** describes if special storage precautions are needed. The Active Pharmaceutical Ingredients should generally be kept dry and protected from light. Most medicaments tolerate "normal temperature" defined as normal room temperature up to 22-24° C.
  - **Remarks** describe whether it is recommended to seek advice from Radio Medical Denmark before using the Active Pharmaceutical Ingredients.
- In addition, precautions needed for the specific Active Pharmaceutical Ingredients are described.

**Warning:** Active Pharmaceutical Ingredients which have been stored

	improperly or are too old can be harmful to health.
<p><b>Guide til:</b></p> <p><b>Fortegnelse og kontroldokument lægemiddelstoffer.</b></p> <p>Publikationen indeholder en fortægelse over de lægemiddelstoffer, der skal være ombord.</p> <p><b>Rækkerne</b> Lægemiddelstofferne er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle smertestillende lægemiddelstoffer organiseret i gruppe 3.</p> <p><b>Kolonnerne</b></p> <p><b>Første kolonne</b> beskriver hvert enkelt lægemiddelstofss nummer. Eksempelvis har morfin nummeret 3.4, hvor tallet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter refererer til det specifikke lægemiddelstof. Lægemiddelstofferne i skibets hospital skal så vidt muligt organiseres efter dette nummersystem</p> <p><b>Anden kolonne</b> beskriver ATC koden, et klassifikations system for medicin. Se mere på <a href="http://www.whocc.no">www.whocc.no</a></p> <p><b>Tredje kolonne</b> beskriver lægemiddelstoffet.</p> <p><i>Bemærkning:</i> Efter lægemiddelstoffet kan være anført et "Δ", dersom produktet er sløvende, og et "K", dersom produktet skal opbevares i køleskab.</p> <p><b>Fjerde kolonne</b> beskriver under "Adm.form", om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klysma, oral opløsning eller inhalation.</p> <p><b>Femte kolonne</b> beskriver styrken pr tablet eller pr. ml.</p> <p><b>Sjette kolonne</b> beskriver mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.</p> <p><b>Syvende kolonne</b> MFAG B beskriver det supplement, skibet skal medbringe, dersom det sejler med farligt gods jf. IMDG koden.</p> <p><i>Bemærkning:</i> Kolonnerne mærket MFAG beskriver de minimumsmængder af supplerende lægemiddelstoffer som skibet skal medbringe, dersom skibet sejler med farligt gods.</p> <p><b>Besætningens medbragte medicin</b> Besætningen har ret til at medbringe egen medicin under den forudsætning, at de til stadighed har en gyldig helbredsundersøgelse for søfarende og fiskere. Medbragte lægemidler skal oplyses til skibsføreren eller sygdomsbehandleren. Lægemidlet skal indskrives med følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lægemidlets navn</li> <li>• Navn på besætningsmedlem</li> <li>• Mængde og antal</li> <li>• Daglig dosis</li> <li>• Dato ind</li> <li>• Eventuel kvittering for modtagelsen. (Kun hvis lægemidlet opbevares på sygelukafet)</li> <li>• Dato ud</li> <li>• Kvittering for modtagelsen (Kun hvis lægemidlet har været opbevaret på sygelukafet)</li> </ul>	<p><b>Guide to:</b></p> <p><b>Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients.</b></p> <p>The publication contains an inventory of mandatory Active Pharmaceutical Ingredients on board.</p> <p><i>The rows</i> The Active Pharmaceutical Ingredients are organized into main groups according to field of application. As an example all analgesics are organized in group 3.</p> <p><i>The columns</i></p> <p><b>First column</b> describes each individual Active Pharmaceutical Ingredient by number. For example, morphine number 3.4, where the number before the dot refers to the main group and the number after the dot refers to the specific Active Pharmaceutical Ingredients. The Active Pharmaceutical Ingredients in the ship's hospital must as far as possible be organized after this numbering system.</p> <p><b>Second column</b> describe the ATC code, a classification system on medicine. See more on <a href="http://www.whocc.no">www.whocc.no</a>.</p> <p><b>Third column</b> describes the Active Pharmaceutical Ingredients</p> <p><i>Note:</i> The Active Pharmaceutical Ingredients can be marked with a "Δ" if the product is sedative and a "R" if the product should be stored in a refrigerator</p> <p><b>Fourth column</b> describes under "Adm.form" whether the Active Pharmaceutical Ingredients should be available as capsules, tablets, suppositories injection liquid, infusion liquid , lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation.</p> <p><b>Fifth column</b> describes the strength per tablet or per ml.</p> <p><b>Sixth column</b> describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry greater amounts than described.</p> <p><b>Seventh column</b> MFAG B describes the supplement the ship must bring if it sails with dangerous goods cf. IMDG code.</p> <p><i>Note:</i> The columns marked MFAG describes the minimum quantities of additional (supplement) active pharmaceutical ingredients the ship must bring, if the ship is carrying dangerous goods.</p> <p><b>Private medicine of crewmembers</b> The crew has a right to bring their own medicine, provided they possess a valid health certificate for seafarers and fishermen at all time. The master or the person in charge of medical care has to be informed about medicine brought along. The medicine must be registered with the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name of the medicine</li> <li>• Name of crewmember</li> <li>• Amount</li> <li>• Daily dosage</li> <li>• Date in</li> <li>• Possible receipt for received medicine. (Only if the medicine is stored at the sickbay)</li> <li>• Date out</li> <li>• Sign when medicine is returned (Only if the medicine has been stored in the sickbay)</li> </ul>

## **Guide til:**

### **Fortegnelse og kontroldokument medicinsk udstyr.**

Publikationen indeholder en fortægelse over det medicinske udstyr, der skal være om bord.

#### **Rækkerne**

Det medicinske udstyr er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle forbindinger og plastre organiseret i gruppe B.

**Første kolonne** beskriver det enkelte medicinske udstyrs bogstav og nummer. Eksempelvis har "Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m", kombinationen nummeret B.9, hvor bogstavet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke medicinske udstyr.

**Anden kolonne** beskriver det specifikke medicinske udstyr.

**Tredje kolonne** beskriver den mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

**Fjerde kolonne** MFAG B beskriver det supplement, skibet skal medbringe, dersom det sejler med farligt gods jf. IMDG koden.

**Bemærkning:** Kolonnen mærket MFAG beskriver de minimumsmængder af supplerende medicinsk udstyr som skibet skal medbringe, dersom skibet sejler med farligt gods

### **Det mobile genoplivningsudstyr A.1**

Søfartsstyrelsen har fastsat regler om ilt og det mobile genoplivningsudstyr i gældende Meddelelser A kapitel IX B. Man kan derudover pakke førstehjælpsudstyr og lægemidler til førstehjælp sammen med det mobile genoplivningsudstyr. Der er udarbejdet forslag til pakning af et mobilt genoplivningsudstyr på [www.søfartsstyrelsen.dk](http://www.søfartsstyrelsen.dk).

### **Etiketter**

Publikationen indeholder en kopi af de etiketter, der skal være på lægemiddelstofferne ved leveringen. Kopien kan anvendes som kontrol af, at lægemidlet er korrekt og påført den korrekte etiket. Er det ikke tilfældet, bør skibsørerens retlede sin leverandør. Ved køb af lægemiddelstoffer, kan en kopi af etiketterne afleveres ved leverandøren. Derefter skal leverandører, før udlevering, påføre de korrekte etiketter,

### **Indeks**

Indekset henviser til lægemiddelstoffersnes brugervejledning. I indekset kan du søge på visse sygdomme, symptomer og alle lægemiddelstoffer.

### **Rekvisition**

I publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemiddelstof og medicinsk udstyr.

### **Medicinkiste- / Mobilt genoplivningsudstyr certifikat.**

Mindst en gang årligt skal skibets lægemiddelstoffer og medicinske udstyr gennemgås.

Det mobile genoplivnings udstyr skal kontrolleres hver 3 måned.

Ved gennemgangen kontrolleres mængden, opbevaringsforhold, udløbsdato og etiketter. Nåle, kanyler og metalinstrumenter kontrolleres for rust. Kontroller, at emballagen er intakt. Vær opmærksom på, at lægemiddelstof og medicinsk udstyr skal opbevares tørt og mørkt, og ikke må opbevares i nærheden af klor.

**Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.**

## **Guide to:**

### **Inventory and Control Document of Medical Equipment.**

The publication contains an inventory of the mandatory medical equipment onboard

#### *The rows*

The medical equipment is organized into main groups according to their main field of application. For example all dressings and plasters are organized in group B.

**First column** describes each individual medical equipment by number. The "elastic gauze", approx. 4 cm x 4 m, carries the combination B.9. The letters before the dot refers to the main group, and the number after the dot refers to the specific medical equipment.

**Second column** describes the specific medical equipment.

**Third column** describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry larger quantities than described.

**Fourth column** MFAG B describes the supplement the ship must bring if it sails with dangerous goods cf. IMDG Code.

**Note:** The columns marked MFAG describes the minimum quantities of additional (supplement) medical equipment the ship must bring, if the ship is carrying dangerous goods.

### **The Mobile Resuscitation Equipment A.1**

The Danish Maritime Authority has established rules for oxygen and the mobile resuscitation equipment in the current Notice A chapter IX B. In addition you may pack equipment and medicine suited for first aid with the resuscitation equipment. Suggestions for the list may be found on [www.dma.dk](http://www.dma.dk).

### **Labels**

The publication contains copies of the labels that must be on each active pharmaceutical ingredient, at the time of delivery. The copy may be used as verification of proper product and label. If labelling is incorrect, the master should guide his supplier.

When purchasing Active Pharmaceutical Ingredients a copy of the label may be delivered to the supplier. Then the supplier applies the correct labels before delivery.

### **Index**

The index refers to the user instruction of active pharmaceutical ingredients. You can search for diseases, symptoms and Active Pharmaceutical Ingredients in the index.

### **Requisition**

In the publication there is a requisition list, where you just fill in the desired quantities of pharmaceutical ingredients and medical equipment.

### **Medicine chest- / Mobile resuscitation equipment certificate.**

At least once a year the ship's Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment must be reviewed.

The mobile resuscitation equipment every 3 months.

When reviewing the quantities, storage conditions, expiry date and labels are controlled. Needles, cannulas and metal instruments are checked for rust. Check if the packaging is intact. Be aware that the Active Pharmaceutical Ingredients and equipment must be stored dry and dark, and not near chlorine.

**Documentation of 3 months and annual Inspection.**

På side 2 og 3 er Medicinkiste – og mobilt genoplivningsudstyr certifikat, som også kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

### **Dispensation for andet lægemiddelstof**

Det er ikke til alle tider, og i alle lande muligt at indkøbe det foretrukne lægemiddelstof. Den danske Søfartsstyrelse og Radio Medical Danmark har derfor udarbejdet en liste med godkendte alternativer. Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen med godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendig at ansøge om dispensation.

Hvis apotek/forhandler tilbyder lægemiddelstof, som ikke findes på nogen liste, skal der søges om dispensation for anden medicin. Dette gøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside, hvor der er en procedure for "Dispensation for anden medicin".

Listen over godkendte alternative, og dertil hørende labels og brugervejledninger kan downloades fra [www.søfartsstyrelsen.dk](http://www.søfartsstyrelsen.dk).

Listen med godkendte alternativer findes i Excel format.

### **Hjælp**

Er der noget du er i tvivl om, står Søfartsstyrelsen Center for det Maritime Sundhedsvæsen til din rådighed. Adressen er:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telefon: +45 7219 6004  
Email: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

On page 2 and 3 is Medicine chest- and mobile resuscitation equipment's certificate's, it can be used to document the inspections. The page's has to be printed and the Master has to sign them.

### **Exemption for other active pharmaceutical ingredients**

It is not at all times and in all countries possible to purchase the preferred Active Pharmaceutical Ingredients. The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have therefore drawn up a list of approved alternatives. If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for exemption.

If the pharmacy / retailer offer Active Pharmaceutical Ingredients that is not on the inventory- or alternative list, you must apply for an exemption. This is done on the DMA website, where there is a procedure for "exemption of medicine".

The list of approved alternative, and associated labels and user instructions can be downloaded from [www.dma.dk](http://www.dma.dk).  
The list of approved alternatives is available in Excel format.

### **Help**

If you have any questions, the Danish Maritime Authority's Centre of Maritime Health Service is at your disposal. The address is:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telephone: +45 7219 6004  
E-mail: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

## Anvendte forkortelser m.v. i Fortegnelse og Brugervejledning

afd. Pul.	=	afdelte pulvere
gel	=	gel til påsmøring på hud
htgl.	=	hætteglas
i. m.	=	intramuskulært = i musklen
inf. Væs.	=	infusionsvæske (til intravenøs brug)
inh. Pul.	=	inhalationspulver
inj. væske	=	injektionsvæske (til i.m. eller s.c.injektion)
i. v.	=	intravenøst = i en vene
"K"	=	opbevares i køleskab
klysma	=	klysma til anvendelse i endetarmen
linim.	=	liniment
gas	=	luftformig gasart til medicinsk anvendelse
mixtur	=	væske som drikkes
næsedr.	=	næsdråber
opløsn.	=	opløsning
s.c.	=	subcutant = under huden
supp.	=	suppositorier = stikpille til brug i endetarmen
⚠	=	sløvende medicin, kan påvirke evnen til maskinbetjening og vagtjeneste
℞	=	Receptpligtig medicin

## Used abbreviations etc. In the Inventory and User instruction

d.p.	=	divisional powder
gel	=	gel for application on the skin
c.v	=	cappedvials
i. m.	=	intramuscular = in the muscle
inf. fl.	=	infusion fluid (for intravenous use)
inh. p.	=	inhalation powder
inj. subst.	=	injection substance (for reconstitution before use)
inj. liquid	=	injection fluid (for i.m. or s.c. injection)
i. v.	=	intravenous = in a vein
"R"	=	stored in refrigerator
enema	=	enema for use in the rectum
linim.	=	liniment
gas.	=	gas for medical use
mixture	=	drinkable liquid
nose d.	=	nose drops
diss.	=	dissolution
s.c.	=	subcutaneous = under the skin
supp.	=	suppositories = suppository for rectal use
⚠	=	sedative medicine, may effect the ability to operate machinery and bridge duty
℞	=	Prescription drugs

**Brugervejledning Lægemiddelstoffer**

**User instruction Active Pharmaceutical  
Ingredients**

## Grp. 1. Ilt / Oxygen

Bevidstløs uden vejrtrækning Bevidstløs med vejrtrækning Medtaget almen tilstand Slag mod kraniet Større kvæstelser Vejtrækningsbesvær  MFAG tabel 2, 3, 5, 9, 11	1.1+1.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Medicinsk ilt.
		<b>Form:</b>	Luft på trykflasker.
		<b>Virkning:</b>	Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.
		<b>Dosering:</b>	Bevidstløse uden vejtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut. Bevidstløse med vejtrækning: Maske med 9 liter/min. Øvrige tilstande: Maske med 1 til 9 liter/min.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ilt er ufarligt til medicinsk brug.
		<b>Holdbarhed:</b>	Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA)
		<b>Opbevaring</b>	Flasker holdes under 50°C
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
		<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Medical oxygen.
		<b>Form:</b>	Gas in pressurized bottles.

## Grp. 2. Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics

Lokalbedøvelse Syning af sår	2.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lidocain.
		<b>Form:</b>	Infektionsvæske 10 mg/ml til subcutan injektion.
		<b>Virkning:</b>	Lokalbedøver på injektionsstedet. Virker efter 1 - 2 minutter. Virker i 2 - 3 timer.
		<b>Dosering:</b>	Mængden afhænger af sårets størrelse. Normalt anvendes 20 - 50 mg. Maksimaldosis er 20 ml svarende til 200 mg. Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergi er sjælden. Ved utilsigtet injektion i blodbanen kan der opstå: 1. føleforstyrrelser, svimmelhed, uklarhed og øresusen, 2. synsforstyrrelser, muskelrysten og kræmper, 3. blodtryksfald og langsom puls.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Må ikke frys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lokalbedøvelse skal ske i et rum med adgang til adrenalin (4.1) og genoplivningsudstyr (A.1). Risiko for alvorlige bivirkninger, hvis lidocain injiceres i blodbanen.

## Grp. 2. Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics

(continued)

Local anaesthetics Suture of wounds	2.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Lidocaine.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 10 mg/ml for subcutaneous injection.
		<b>Effect:</b>	Anaesthetises the place of injection. Takes effect after 1-2 minutes. Effective for 2-3 hours.
		<b>Dosage:</b>	The amount depends on the size of the wound. Normally, 20-50 mg is used. The maximum dose is 20 ml, equivalent to 200 mg. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.
		<b>Side-effects:</b>	Allergy seldom occurs. In case of an unintended injection into the bloodstream, the following side-effects may occur: 1. affective disturbances, dizziness, confusion, and buzzing in the ears, 2. visual disturbances, muscle contractions, and convulsions, 3. falling blood pressure and slow pulse.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. Not to be frozen.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Local anaesthetics must be administered in a room with access to adrenaline (4.1) and resuscitation equipment (A.1). Risk of serious side-effects if lidocaine is injected directly into the bloodstream.
Lokalbedøvelse Kløestillende	2.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lidocain.
		<b>Form:</b>	Gel, 20 mg/g (2%).
		<b>Virkning:</b>	Lokalbedøver hud og sårrande. Kløestillende.
		<b>Dosering:</b>	Anvendes som lokalbedøvelse ved smertende sår eller smertefulde procedurer, fx ved rengøring af brandsår eller større og forurenede sår. Et tykt lag gel påsmøres huden, der herefter afdækkes lufttæt i ca. 15 minutter. Virker efter ca. 15 minutter. Virker i ca. 30 minutter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergi er sjælden.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Local anaesthetics Relieves itching	2.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Lidocaine.
		<b>Form:</b>	Gel, 20 mg/g (2%).
		<b>Effect:</b>	Anaesthetises the skin and the edges of wounds. Relieves itching.
		<b>Dosage:</b>	To be used as local anaesthetics in case of painful wounds or procedures, e.g. cleansing of burns or large, dirty wounds. A thick layer is applied to the skin, which is subsequently covered in an air-proof condition for about 15 minutes. Takes effect after about 15 minutes. Effective for about 30 minutes.
		<b>Side-effects:</b>	Allergy seldom occurs.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.

		Remarks:	Consult Radio Medical.
--	--	----------	------------------------

### Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

Feber Svage smerter: Hovedpine Muskelssmerter Ledsmerter Rygssmerter  MFAG tabeller: 7, 8, 13	3.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Paracetamol.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 500 mg.
		<b>Virkning:</b>	Feberned sættende og smertestillende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 1 g 3 - 4 gange dagligt. Højst 4 g per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverkade, lever svigt og død.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Ingen.
Fever Weak pains: Headache Muscle pains Pain in joints Back pains  MFAG tables: 7, 8, 13	3.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Paracetamol.
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg.
		<b>Effect:</b>	Pain relieving and reduces fever.
		<b>Dosage:</b>	Adults: 1 g three-four times daily. Not more than 4 g daily.
		<b>Side-effects:</b>	Doses of more than 15-20 g involve liver damage, liver failure, and death.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	None.
Moderate smerter: Menstruationssmerter Ledsmerter Knoglesmerter Knoglebrud Muskelssmerter	3.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Ibuprofen.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 400 mg.
		<b>Virkning:</b>	Smertestillende og feberned sættende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 400 mg 3 - 4 gange dagligt. Højst 1800 mg per døgn. Undtagelsesvis op til 2400 mg per døgn i kortere perioder (4 - 6 uger).
		<b>Bivirkninger:</b>	Ondt i maven.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Ibumetin®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre, 2. astmapatienter, 3. patienter i blodfortyndende behandling, 4. patienter med symptomer på mavesår.

**Grp. 3. Smertestillende midler**
**(continued)**

Moderate pains: Period pains Pain in joints Bone-ache Fractures Muscle pains	3.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Ibuprofen.  Tablets of 400 mg.  Pain relieving and reduces fever  Adults: 400 mg three-four times daily. Not more than 1800 mg daily. Exceptionally, up to 2400 mg daily for shorter periods of time (4-6 weeks).  Stomach ache.  5 years from the date of production (Ibumetin®, Nycomed Danmark).  Normal temperature.  Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid, 2. asthma patients, 3. patients in blood diluting treatment, 4. patients with symptoms of ulcer.
Stærke smerter: Store sårskader Kvæstelser Forbrændinger Knoglebrud Nyresten Galdesten Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin)  MFAG tabel 7, 8,10,13	3.4	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Morfin $\Delta$ .  Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à 1 ml.  Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (sc.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer  Subcutant og intramuskulært (voksne) 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.  Svækker vejtrækningen. Kvalme og opkastning. Hæmmer optagelsen af medikamenter fra mavesækken. Kan give forstoppelse og hæmme blæretømningen.  2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek)  Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved overdosering kan vejtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1) Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemedler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Oberør vejtrækningen og ventilere om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske (A.1)

**Grp. 3. Smertestillende midler**
**(continued)**

Severe pain Major wounds Injuries Burns Fractures Kidney stone Gall stone Coronary thrombosis (see first aid under 9.1 Glyceryl trinitrate)  MFAG Tabel 7,8,10,13	3.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Morphine $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.
		<b>Effect:</b>	Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection. Takes effect immediately in case of intravenous injection Effective for 3-4 hours
		<b>Dosage:</b>	Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient. Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not sufficient.
		<b>Side-effects:</b>	Restricts breathing. Nausea and vomiting. Restricts the absorption of medicaments from the stomach. May cause constipation and restrict bladder emptying.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be protected from light.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> In case of an overdose, the patient may stop breathing. Antidote: Naloxone (5.1) This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage. Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1).
Lette til moderate smerter	3.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Tramadol $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Kapsel à 50 mg
		<b>Virkning:</b>	Smertestillende
		<b>Dosering:</b>	100 – 200 mg dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, svimmelhed, mundtørhed, opkastning, obstipation. Hovedpine, døsighed, træthed. Øget svedtendens.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato, (Tadol, PharmaCoDane ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.
Weak to moderate pain	3.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Tramadol $\Delta$
		<b>Form:</b>	Capsule of 50 mg
		<b>Effect:</b>	Pain relieving
		<b>Dosage:</b>	100-200 mg daily
		<b>Side-effects:</b>	Dizziness, nausea, vomiting, constipation, dry mouth, head ache, drowsiness, fatigue, increased sweating.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production ( Tadol, PharmaCoDane ApS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used in case of pregnancy.

#### Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge

Allergisk shock	4.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Adrenalin.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammenækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.
		<b>Dosering:</b>	Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.
		<b>Bivirkninger:</b>	Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Adrenalin®, DAK), hvis opbevaret ved 2-8°C. 6 måneder fra produktionsdato (Adrenalin®, DAK), hvis opbevaret under 25°C
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt og mørkt.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Epinephrine.
Allergic shock	4.1	<b>Form:</b>	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes.
		<b>Dosage:</b>	Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.
		<b>Side-effects:</b>	High blood pressure, rapid pulse, shivering, and dizziness.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Adrenalin®, DAK), if stored at 2 °C - 8 °C or 6 months if stored less than 25 °C
		<b>Storage:</b>	To be stored in a cool and dark place.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Potentially fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.

**Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge**
**(continued)**

Allergi Høfeber Nældefeber Allergisk ansigtsødem Allergisk astma	4.2	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Acrivastin.  Kapsler à 8 mg.  Modvirker allergi. Maksimal virkning efter 1½ - 2 timer. Virkningsvarighed op til 8 timer.  Voksne: 8 mg efter behov. Maksimalt 3 gange per døgn.  Døsigthed kan forekomme og forstærkes af alkohol og beroligende midler, herunder sovemedler.  3 år fra produktionsdato (Benadryl®, McNeil ApS).  Almindelig temperatur.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lægemidlet er ikke mærket med Δ men enkelte personer sløves alligevel så meget, at det er uforsvarligt med vagttjeneste eller maskinbetjening. Ved lungesymptomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Hay fever Urticaria Allergic face oedema Allergic asthma	4.2	<b>Active pharmaceutical</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Acrivastine.  Capsule of 8 mg.  Eases allergic symptoms. Maximum effect after 1.5-2 hours. Effective for up to 8 hours.  Adults: 8 mg when required. Maximum three times daily  Drowsiness may occur and is increased by the use of alcohol and sedatives, including sleeping medicine.  3 years from the date of production (Benadryl®, McNeil Denmark ApS).  Normal temperature.  Consult <i>Radio Medical</i> . The medicament is not marked with a Δ, but some patients experience a high degree of drowsiness, making bridge duty and operations of machinery unsafe. In case of symptoms of from the lungs: See group 15.

## Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge

(continued)

Allergi Allergisk astma Allergisk ansigtsødem	4.3	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Hydrocortison.  Injektionssubstans 100 mg i to-delt hætteglas med 2 ml steril vand til intramuskulært eller intravenøst brug.  Modvirker allergi og inflammationser. Virkningen indtræder først 4 - 6 timer efter injektion, hvorfor anden akut behandling skal dække dette tidsrum.  Voksne: 100 mg intramuskulært eller intravenøst som éngangsdosis.  Ved længere tids anvendelse: Forstyrrelser i sukker, vand- og saltstofskiftet og i kirtlernes funktion. Sløring og/eller aktivering af infektioner. Eufori, sindssyge og søvnsløshed. Ondt i maven og mavesår.  5 år fra produktionsdato (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Brugsfærdig injektionsvæske holdbart i 72 timer, hvis opbevaret i køleskab.  Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved lungesymptomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Allergic asthma Allergic face oedema	4.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Hydrocortisonsuccinate  Injection substance, 100 mg in capped vial divided into two sections, with 2 ml sterile water for intramuscular or intravenous use.  Eases symptoms of allergy and inflammations. Does not take effect until 4-6 hours after the injection. Other acute treatment to cover this period is needed  Adults: 100 mg given intramuscularly or intravenously as a single dose.  If used for a extendet period: Disturbances in the sugar, water and salt metabolism and in the glandula functions. Masking and/or activation of infections. Euphoria, mental illness and insomnia. Stomache ache and ulcer.  5 years from the date of production (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Injection liquid ready for use, valid for 72 hours, if stored cold.  Normal temperature. To be kept out of daylight. Injection liquid ready for use, to be stored refrigerated.  Consult <i>Radio Medical</i> . In case of symptoms from lungs See also group 15.

**Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge**
**(continued)**

Søsyge	4.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Cinnarizin $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tablet à 25 mg.
		<b>Virkning:</b>	Modvirker søsyge.
		<b>Dosering:</b>	25 mg en ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
		<b>Bivirkninger:</b>	Døsighed
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).
Seasickness	4.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Cinnarizin $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tablet à 25 mg.
		<b>Effect:</b>	Modvirker søsyge.
		<b>Dosage:</b>	25 mg en ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
		<b>Side-effects:</b>	Døsighed
		<b>Validity:</b>	5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
		<b>Storage:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Remarks:</b>	Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).

## Grp. 5. Antidoter / Antidotes

Modgift ved overdosering af morfin  MFAG tabel 4, 13  Førstehjælp: Ved udsættende vejtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l ilt/minut.  .	5.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Naloxon.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker 2 - 3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.
		<b>Dosering:</b>	1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært. 2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).
		<b>Opbevaring:</b>	Beskyttes mod lys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Antidote to be administered in case of an overdose of morphine  MFAG table 4, 13  First Aid: If the patient stops breathing, assist breathing manually with oxygen 15l/minute on a mask.  .	5.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Naloxone.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.
		<b>Dosage:</b>	1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immediately intramuscular. 2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.
		<b>Side-effects:</b>	Shivering, feeling unwell, and vomiting.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).
		<b>Storage:</b>	To be protected from daylight.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 5. Antidoter / Antidotes**
**(continued)**

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glucagon.
		<b>Form:</b>	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml steril vand til intramuskulært brug.
		<b>Virkning:</b>	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5 - 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 - 15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesyge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
		<b>Holdbarhed:</b>	Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8° C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur eller 2 - 8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Glucagon.
		<b>Form:</b>	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		<b>Effect:</b>	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		<b>Dosage:</b>	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
		<b>Validity:</b>	At room temperature: 18 months from the date of production (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature or 2-8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.

**Grp. 5. Antidoter / Antidotes**
**(continued)**

MFAG tabel 17 Forgiftninger med insektgifte, der indeholder organophosphater eller carbamater.	5.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Atropin.
		<b>Form:</b>	Infektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intravenøs injektion.
		<b>Virkning:</b>	Livreddende ved forgiftninger af visse insektgifte. Virkningen afhænger af gifttype og mængde. Se MFAG tabel 17.
		<b>Dosering:</b>	Dosis afhænger af forgiftningen. Atropin indgives langsomt intravenøst. Der startes med 2 mg (2 ampuller) og fortsættes med yderligere 2 mg efter hver 5 - 10 minutters mellemrum indtil pupillerne begynder at udvide sig. Giftig dosis er 10 - 20 mg til voksne. Dødelig dosis er ca. 200 mg til voksne.
		<b>Bivirkninger:</b>	Pupiludvidelse, lysskyhed, tørre slimhinder, hurtig puls, vandladningsbesvær og forstoppelse.
		<b>Holdbarhed:</b>	Plastampuller: 2 år fra produktionsdato. (Atropin®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 17 Poisoning with insecticides containing organophosphates or carbamates.	5.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Atropin.
		<b>Form:</b>	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intravenous injection.
		<b>Effect:</b>	Life-saving in connection with poisonings caused by certain insecticides. The effect depends on the type and amount of poison. See MFAG table 17.
		<b>Dosage:</b>	The dose depends on the poisoning. Atropin is given slowly intravenously. At first, 2 mg (2 ampoules) is given, followed by another 2 mg after every 5-10 minutes until the pupils start dilating. Poisonous dose is 10-20 mg for adults. Lethal dose is about 200 mg for adults.
		<b>Side-effects:</b>	Dilation of the pupils, photophobia, dry mucous membranes, rapid pulse, dysuria and constipation.
		<b>Validity:</b>	Plastic ampoules: 2 years from the date of production (Atropin®, Nycomed Danmark)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .
MFAG tabel 8, 16 Ætsninger med fluorholdige salte og syrer.	5.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Calciumgluconat 2%.
		<b>Form:</b>	Tuber à 25 g, indeholdende 2 g calciumgluconat per 100 g. Fremstilles af apoteket.
		<b>Virkning:</b>	Calcium neutraliserer i et vist omfang ætsningsskaderne ved fluoridætsninger.
		<b>Dosering:</b>	Huden indsmøres i calciumgluconat gel. Se vejledning i MFAG tabel 8 og 16.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 5. Antidoter / Antidotes**
**(continued)**

MFAG table 8, 16 Caustic burns caused by salts and acids containing fluorine.	5.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Calciumgluconate 2%.
		<b>Form:</b>	Tubes of 25 g, containing 2 g of calciumgluconate per 100 g. Made by the individual pharmacy.
		<b>Effect:</b>	Calcium neutralizes caustic burns caused by fluorine to some extent.
		<b>Dosage:</b>	Calciumgluconate gel is applied to the skin. See guidelines in MFAG table 8 og 16.
		<b>Side-effects:</b>	None.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .
MFAG tabel 16 Ætsninger med fluorholdige salte og syrer, der omfatter mere end 1% af hudens overflade.	5.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Calciumlactogluconat og calciumcarbonat.
		<b>Form:</b>	Brusetabletter à 500 mg.
		<b>Virkning:</b>	Neutraliserer i et vist omfang skader efter optagelse af fluorsalte og fluorid forbindelser gennem huden.
		<b>Dosering:</b>	Ordination af <i>Radio Medical</i>
		<b>Bivirkninger:</b>	Normalt ingen bivirkninger
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Calcium-Sandoz®, Novartis).
		<b>Opbevaring:</b>	Er fugtfølsomt. Opbevares tørt i tæt emballage ved almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 16 Caustic burns caused by salts and acids containing fluorine and covering more than 1% of the surface of the skin.	5.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Calciumlactogluconate and calciumcarbonate.
		<b>Form:</b>	Effervescent tablets of 500 mg.
		<b>Effect:</b>	Neutralizes injuries caused by the absorption of fluoride compounds through the skin to some extent.
		<b>Dosage:</b>	Contact <i>Radio Medical</i>
		<b>Side-effects:</b>	No side effects
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Calcium-Sandoz, Orifarm).
		<b>Storage:</b>	Sensitive to humidity. To be stored in a dry place in a sealed packaging at room temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 5. Antidoter / Antidotes**
**(continued)**

MFAG tabel 10 Forgiftninger og ætsninger i mave og tarm.	5.6	<b>Lægemiddelstof:</b>	Aktivt kul.
		<b>Form:</b>	50 g aktivt kul i granulatform til opblanding i 400 ml vand.
		<b>Virkning:</b>	Opsuger gift og lægemidler fra mavetarmkanalen og binder stofferne til kulpartiklerne.
		<b>Dosering:</b>	50 - 100 g kul (1 - 2 flasker) opslemmet i vand indtages så hurtigt som muligt. Ved alvorlige forgiftninger fortsættes med 20 g (160 ml) hver 6. time. Se også MFAG, Appendix 14.
		<b>Bivirkninger:</b>	Farver afføringen sort. Kan give forstoppelse. Nedsætter virkningen af lægemidler, der er indtaget via munden.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Carbomix Norit®). Efter opblanding i vand: Maks. 3 dage i køleskab.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
MFAG table 10  Poisoning and caustic burns in stomach and intestines.	5.6	<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Anvendes ikke til bevidstløse. Må ikke anvendes ved indtagelse af stærke syrer/baser eller organiske opløsningsmidler (petroleumslignende).
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Active carbon.
		<b>Form:</b>	50 g of active carbon in the form of granulate for dilution in 400 ml of water.
		<b>Effect:</b>	Absorbs poison and medicaments from the gastrointestinal tract and binds the substances to the carbon particles.
		<b>Dosage:</b>	50-100 g carbon (1-2 bottles) suspended in water is taken as quickly as possible. In case of serious poisonings, continue with 20 g (160 ml) every sixth hour. See also MFAG, Appendix 14.
		<b>Side-effects:</b>	Black faeces. May cause constipation. Reduces the effect of medicaments taken through the mouth.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Carbomix Norit®). After having been mixed with water, maximum 3 days in the fridge.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Do not use on unconscious patients. Not to be used in connection with strong acids/bases or organic solvents (kerosene related).

**Grp. 5. Antidoter / Antidotes**
**(continued)**

MFAG tabel 19 Forgiftninger med methanol og ethylene glycol	5.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Ethyl alkohol 99,5% (alternativt 99,9%).
		<b>Form:</b>	Væske.
		<b>Virkning:</b>	Modgift mod methanol og ethyenglucols virkning.
		<b>Dosering:</b>	25 ml opblandes i 250 – 300 ml vand eller saft. Dosis gentages hver 3 time indtil evakuering. Se MFAG tabel 19.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, hovedpine.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig stuetemperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 19 Poisoning caused by methanole and ethylene glycole	5.7	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Ethyl alcohol 99,5% (alternative 99,9%)
		<b>Form:</b>	Liquid.
		<b>Effect:</b>	Antidote against the effect of methanole and ethylene glucole
		<b>Dosage:</b>	25 ml is mixed with 250-300 ml water or juice. Repeat every 3 hours until evacuation. See MFAG table 19.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting and headache.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

## Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion

Angst og urotilstande Alkoholabstinenser Forebyggelse af kramper Ledskred og brud  1. valgspræparat ved akut sindsyge (alternativt anvendes klysma (6.3)	6.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Diazepam $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Tabletter à 5 mg.
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker efter 30 minutter. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		<b>Dosering:</b>	5 mg x 3 dagligt. Akut sindsyge: Dosis efter aftale med <i>Radio Medical</i> . Se også 6.4.
		<b>Bivirkninger:</b>	Vanedannende. Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Diazepam, Nycomed
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
Anxiety and states of restlessness Alcoholic withdrawal symptoms Prevention of convulsions Dislocations and fractures  First choice of medicament in case of acute mental disease (alternatively, Enema (6.3) are used.)	6.2	<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Diazepam $\Delta$
		<b>Form:</b>	Tablets of 5 mg.
		<b>Effect:</b>	Strongly sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect after 30 minutes. Is excreted very slowly (halving time: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		<b>Dosage:</b>	5 mg three times daily Acute mental disease: Dose after consultation with Radio Medical. See also 6.4.
		<b>Side-effects:</b>	Addictive. Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Diazepam, Nycomed Danmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult Radio Medical.
Universelle kramper Kramper fra forgifninger Abstinenskramper Epilepsi  Akut sindsyge  MFAG tabel 4, 5, 6	6.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Diazepam $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Klysma, 4 mg/ml, 2,5 ml per klysma til anvendelse i endetarmen
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		<b>Dosering:</b>	10 mg (1 klysma) tømmes ind i endetarmen.
		<b>Bivirkninger:</b>	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid <sup>®</sup> , Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur..
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

**Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion** (continued)

Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy  Acute mental illness  MFAG tabel 4, 5, 6	6.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Diazepam. $\Delta$
		<b>Form:</b>	Enema, 4 mg /ml, 2,5 ml per enema for insertion into the rectum.
		<b>Effect:</b>	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		<b>Dosage:</b>	(1 enema) is emptied into the rectum.
		<b>Side-effects:</b>	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		<b>Validity:</b>	2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/S). However, maximum 1 year after having opened the
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
2. valgspræparat ved akut sindsyge præget af mani, vildskab, psykisk og Motorisk uro, angst, vrangforestillinger og hallucinationer.  Kvalme og opkastninger	6.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Haloperidol $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 5 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Afdæmper symptomerne ved sindsygen. Dæmper kvalme og opkastninger.
		<b>Dosering:</b>	Akut sindsyge: 5 - 10 mg intramuskulært. Kan eventuelt gentages 3 eller flere gange dagligt. Behandlingen kan eventuelt forstærkes med diazepam (6.2/6.3).
		<b>Bivirkninger:</b>	Den sløvende effekt forstærkes af alkohol, morfin og andre sløvende midler.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Serenase®, Janssen-Cilag).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of acute mental illness characterized by mania, wildness, mental and motoric restlessness, anxiety, delusions, and hallucinations.  Nausea and vomiting	6.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Haloperidole. $\Delta$ .
		<b>Form:</b>	Injection liquid 5 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Restricts the symptoms of mental disease. Reduces nausea and vomiting.
		<b>Dosage:</b>	Acute mental disease: 5-10 mg intramuscularly. May be repeated three times daily or more. The treatment may be enhanced by the use of diazepam (6.2/6.3).
		<b>Side-effects:</b>	The sedative effect is increased by alcohol, morphine, and other sedatives.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Serenase®, Janssen-Cilag).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)**

Søvnløshed Indsovningsbesvær	6.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Zolpidem Δ.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 10 mg.
		<b>Virkning:</b>	Stærkt sløvende Virker hurtigt efter indtagelse Virkningen varer op til 6 timer Virkningen forstærkes af andre sløvende stoffer, herunder alkohol
		<b>Dosering:</b>	Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré. Hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, svimmelhed, døsighed, hudreaktioner, dobbeltsyn.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Zolpidem Hexal A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
Insomnia Difficulty falling asleep	6.5	<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
		<b>Active pharmaceutical</b>	Zolpidem Δ
		<b>Form:</b>	Tablets of 10 mg
		<b>Effect:</b>	Strong sedative, rapid effect after ingestion, Effective up till 6 hours. The effect is increased by the use of other sedatives, including alcohol
		<b>Dosage:</b>	Adults. 10 mg 15-30 minutes. before bedtime.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhea. Headache, difficulty concentrating, confusion, memory loss, dizziness, drowsiness, skin reactions, double vision
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Zolpidem Hexal A/S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature

## Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse	7.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Phenoxytmethylpenicillin
		<b>Form:</b>	Tabletter à 660 - 800 mg (ca.1 mill. IE)
		<b>Virkning:</b>	Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene
		<b>Dosering:</b>	400 mg – 800 mg × 2 – 4 dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, diarré og hududslæt. Sjældent ses overfølsomhedsshock
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Primcillin®, MEDA)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1)
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia	7.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Phenoxytmethylpenicillin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU)
		<b>Effect:</b>	Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.
		<b>Dosage:</b>	400-800 mg × 2-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Vomiting, diarrhoea and rash. Rarely allergic shock
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production ( Primcillin®, MEDA)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner  Alternativ til penicillin ved allergi  MFAG tabel 9	7.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Erythromycin.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 500 mg.
		<b>Virkning:</b>	Standser bakteriernes vækst.
		<b>Dosering:</b>	250 - 500 mg x 2 - 4 dagligt. Ved alvorlig infektion kan dosis øges til 4 g per døgn. Tabletter gives umiddelbart før måltid. (Enterotabletter gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter).
		<b>Bivirkninger:</b>	Madlede, kvalme, mavekneb og forbigående diaré.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Abbotycin, Amdipharm Limited).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**
**(continued)**

Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer  Alternative to penicillin in case of allergy  MFAG table 9	7.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Erythromycin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg.
		<b>Effect:</b>	Stops bacterial growth.
		<b>Dosage:</b>	250-500 mg two-four times daily case of a serious infection, the dose may be increased to 4 g a day. Tablets are given immediately before a meal. (Enterotables are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest).
		<b>Side-effects:</b>	Loss of appetite, nausea, stomach cramp, or transient diarrhoea.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Abbotin, Amdipharm Limited).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Halsbyld Tandbyld  Knogleinfektion  Underlivsinfektioner Tarminfektioner Blindtarmsbetændelse  MFAG tabel 10	7.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Metronidazol.
		<b>Form:</b>	Stikpille à 500 mg
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende.
		<b>Dosering:</b>	500 mg x 3 daglig
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, forstoppelse, og smagsforstyrrelse. Mørkfarvet urin. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/ S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan om nødvendigt anvendes, til gravide. Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, fx Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9). Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dexofan.
Boil in the throat Tooth abscess  Bone infection Infection of female reproductions organs Abdominal infections Intestinal infections Appendicitis (Check dipstick G.1)  MFAG table 10	7.7	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Metronidazol.
		<b>Form:</b>	Suppository of 500 mg
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria.
		<b>Dosage:</b>	500 mg three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Nausea vomiting, abdominal pain, diarrhea, constipation, and taste disturbance. Dark colored urine. May cause a reaction similar to Antabuse in connection with alcohol.
		<b>Validity:</b>	3 years from productions date (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/ S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . May be used during pregnancy, if nessasary. Often used in combination with other antibiotics e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9). May not be used with 15.1 Dextromethorphan

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**
**(continued)**

Tandbyld Halsbyld Svær bronkitis Lungepest  Akut diarré Kolera Dysenteri Blindtarmsbetændelse Gonoré Urinrørsbetændelse Nyrebækkenbetændelse (tjek urinstiks G.1)	7.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Ciprofloxacin.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 250 mg.
		<b>Virkning:</b>	Dræber bakterier.
		<b>Dosering:</b>	250 - 750 mg x 2 dagligt. Tabletterne gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter.
		<b>Bivirkninger:</b>	Mavekneb, kvalme, opkastninger, madlede, hovedpine, svimmelhed, træthed og kramper, muskel-, led- og seneømhed, allergi, overfølsomhedsreaktion ved samtidig udsættelse for sollys.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Cifin, PharmaCoDane ApS).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med Radio Medical. Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7). Må ikke gives til gravide eller ammende.
Boil in the throat Tooth abscess Severe bronchitis Pneumonic plague Acute diarrhoea Cholera Dysentery Appendicitis Gonorrhoea Urethritis Pyelitis (Check dipstick G.1)	7.8	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Ciprofloxacin.
		<b>Form:</b>	Tablets of 250 mg.
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria.
		<b>Dosage:</b>	250-750 mg twice dailyThe tablets are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest.
		<b>Side-effects:</b>	Bellyache, nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, fatigue, and convulsions. Soreness in the muscles, joints and tendons. Allergy. Allergic reaction in case of simultaneous exposure to sunlight.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Cifin, PharmaCoDane Aps).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult Radio Medical. Is given in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections. Should not be given to pregnant or breast-feeding patients.

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**
**(continued)**

Stivkrampevaccine  Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadete med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.  Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).  Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.	7.10	<b>Lægemiddelstof:</b>	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		<b>Form:</b>	Infektionsvæske
		<b>Virkning:</b>	Aktiverer patientens immunsystem.
		<b>Dosering:</b>	Følg ordination fra Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		<b>Effect:</b>	Activates the patient's immune system.
		<b>Dosage:</b>	Follow prescription from Radio Medical
		<b>Side-effects:</b>	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		<b>Storage:</b>	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**
**(continued)**

Stivkrampemedgift  Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.  Tetanus immunglobulin suppleres med vaccine (se 7.10).  Behandlingen skal ske i behandlingsrum med adgang til 4.1 Adrenalin og A.1 Genoplivningsudstyr.	7.11	<b>Lægemiddelstof:</b>	Humant tetanus immunglobulin.
		<b>Form:</b>	Infektionsvæske 250 I.E. Ampul à 1 ml til intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Bekæmper giftstoffer produceret af stivkrampebakterien.
		<b>Dosering:</b>	1 injektion à 250 I.E. (1 ml) intramuskulært. Suppleres med tetanusvaccine (se 7.10).
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal rødme, hævelse, ømhed og feber ses undertiden. Allergisk shock og andre allergiske reaktioner forekommer, men sjældent.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Tetagam® P/Tetanogamma® P, Centeon).
		<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen immunglobulin må ikke anvendes. Må ikke anvendes, hvis væsken fremstår uklar eller klumpet.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).
Tetanus antidote  To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.  Tetanus immune globulin is to be supplemented by a vaccine (see 7.10).  The treatment must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.	7.11	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Human tetanus immunoglobulin.
		<b>Form:</b>	Injection liquid 250 IU. Ampoule of 1 ml for intramuscular injection.
		<b>Effect:</b>	Combats poisonous substances produced by the tetanus bacteria.
		<b>Dosage:</b>	1 injection of 250 IU (1 ml) given intramuscularly. To be supplemented by the tetanus vaccine (see 7.10).
		<b>Side-effects:</b>	Local blushing, swollenness, soreness, and fever are sometimes seen.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Tetagam® P/Tetanogamma® P, CSL Behring).
		<b>Storage:</b>	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen immune globulin must not be used. Not to be used if the liquid is muddy or lumpy.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Infektioner forårsaget af stafylokokker. Knogleinfektion	7.12	<b>Lægemiddelstof:</b>	Flucloxacillin
		<b>Form:</b>	Tablet à 500 mg
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende
		<b>Dosering:</b>	750 - 1000 mg 3-4 gange dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré, hududslæt.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato. Åbne blisterpakninger 6 måneder (Heracillin, Meda AS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Infections caused by staphylococci. Infections in the bones	7.12	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Flucloxacillin
		<b>Form:</b>	Tablets of 500 mg
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria
		<b>Dosage:</b>	750-1000 mg 3-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhea, skin rash
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production. 6 months for open blister pack(Heracillin, Meda AS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections**
**(continued)**

Urinvejsinfektioner Lungebetændelse	7.13	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Sulfamethoxazol+trimitroprim  Tablet à 400 mg+80 mg  Bakteriedræbende  2 tablettet 2 gange dagligt  Feber. Betændelse på tungen, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, hudkløe, hududslæt.  2 år fra produktionsdato. (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Apotek)  Almindelig temperatur  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.
Urinary tract infection Pneumonia	7.13	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Sulfamethoxazole+trimitroprim  Tablets of 400 mg + 80 mg  Kills bacteria  2 tablets twice daily  Fever. Inflammation of the tongue, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, pruritus, rash  2 years from the date of production (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Phamacy)  Normal temperature  Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used during pregnancy

## Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac Medicine

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet  Førstehjælp: Hjertestilling (eleveret overkrop) 2 - 3 l i lt/minut Glycerylnitrat (9.1) Acetylsalicylsyre (9.3)  Evt. for smerter: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)	9.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glycerylnitrat
		<b>Form:</b>	Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.
		<b>Virkning:</b>	Udvider blodkar. Virker inden 1 minut. Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter.
		<b>Dosering:</b>	Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderseite. 1 pust så hurtigt som muligt efter smerters opståen. Kan gentages 1 gang. Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin (3.4).
		<b>Bivirkninger:</b>	Ansigtsrødme, hovedpine og kvalme. Kan sænke blodtrykket lidt.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mm Hg systolisk. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.
		<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Glyceryl trinitrate.
		<b>Form:</b>	Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.
Angina pectoris Heart pain Coronary thrombosis  First aid: Sit up in comfortable position 2-3 l oxygen/minute Glyceryl trinitrate (9.1) Acetylsalicylic acid (9.3)  Possibly against pain: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)	9.1	<b>Effect:</b>	Expands the blood vessels. Takes effect within 1 minute. Effective for 10-30 minutes.
		<b>Dosage:</b>	The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek. 1 spray as soon as possible after the pain has occurred. May be repeated once. If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4).
		<b>Side-effects:</b>	Blushing, headache, and nausea. May cause a minor fall in blood pressure.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).
		<b>Storage:</b>	Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Control the blood pressure, which should not be below 90 mm Hg systolic. Not to be used close to open fire or embers.

**Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac**
**(continued)**

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Blodfortynding  Se også 9.1	9.3	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Acetylsalicylsyre.  Tabletter à 150 mg.  Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.  Akut: 300 mg som tygges Vedligehold: 75 mg dagligt  Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.  5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).  Almindelig temperatur.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Cardiospasm Heart pain Coronary thrombosis Blood-thinning  See also 9.1	9.3	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Acetylsalicylsyre.  Tabletter à 150 mg.  Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.  Akut: 300 mg som tygges Vedligehold: 75 mg dagligt  Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.  5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).  Almindelig temperatur.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Vand i lungerne Forhøjet blodtryk	9.4	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Furosemid.  Tabletter à 40 mg.  Tvinger væske ud af blodbanen via nyrene til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv). Virker 1/2 time efter indtagelse. Maksimumeffekt efter 2 timer. Virkningsvarighed: 3 - 6 timer.  Vand i lungerne: 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter. Blodtryksforhøjelse: 40 - 80 mg x 1 - 3 dagligt. (maksimalt 1500 mg/døgn).  Ingen relevante.  5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).  Almindelig temperatur.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac**
**(continued)**

Lung edema High blood pressure	9.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Furosemide
		<b>Form:</b>	Tablets of 40 mg.
		<b>Effect:</b>	Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue). Takes effect after 1/2 hour. Maximum effect after 2 hours. Effective for 3-6 hours.
		<b>Dosage:</b>	Lungedema: 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes High blood pressure: 40-80 mg once to three times daily (maximum 1500 mg/day).
		<b>Side-effects:</b>	None relevant.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents**

Brandsår	10.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Sølvsulfadiazin.
		<b>Form:</b>	Creme 10 mg/g (1%).
		<b>Virkning:</b>	Forebygger hudinfektioner ved brandsår.
		<b>Dosering:</b>	Påføres i et 3 - 5 mm tykt lag 1 gang per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Hudirritation.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Flamazine®, Smith & Nephew). Tuber bør kasseres 14 dage efter åbning.
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Se anvisningen i Søfartsstyrelsens Lægebog.
Burns	10.4	<b>Active pharmaceutical</b>	Silver sulfadiazine.
		<b>Form:</b>	Lotion 10 mg/g (1%).
		<b>Effect:</b>	Prevents skin infections in connection with burns.
		<b>Dosage:</b>	Apply a thin layer of 3-5 mm to the skin once a day.
		<b>Side-effects:</b>	Skin irritation.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Flamazine®, Smith & Nephew) Tubes should be discarded 14 days after opening.
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . See the instructions given in the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

**Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents**
**(continued)**

Lus Fladlus Fnat	10.6	<b>Lægemiddelstof:</b>	Permethrin.
		<b>Form:</b>	Shampo 10 mg/g (1%).
		<b>Virkning:</b>	Gift, der dræber lus, fnatmider og deres æg.
		<b>Dosering:</b>	Indgnides i det renvaskede, frotterede og fugtige hår og hårbund. Shampoen skal sidde i 10 minutter før den skylles ud. Døde lus og æg fjernes med tættekom, mens håret endnu er vådt. Behandlingen gentages efter 8 dage.
		<b>Bivirkninger:</b>	Kløe og rødme af huden.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB ).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Se instruktionen i indlægsseddel.
Lice Crab lice Scabies	10.6	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Permethrin.
		<b>Form:</b>	Shampoo 10 mg/g (1%).
		<b>Effect:</b>	Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.
		<b>Dosage:</b>	Apply to washed, rubbed, and wet hair and scalp. The shampoo should not be rinsed off until after 10 minutes. Dead lice and eggs are removed with a fine comb while the hair is still wet. The treatment is repeated after 8 days.
		<b>Side-effects:</b>	Itching and skin blushing.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	See package leaflet.
Eksem Psoriasis Hudkløe Solskoldning Hudsvie efter insektbid	10.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glukokortikoid gruppe II
		<b>Form:</b>	Creme til udvortes brug
		<b>Virkning:</b>	Modvirker betændelsestilstande, der er fremkaldt af allergiske og toksiske årsager. Virker kløestillende og smertestillende.
		<b>Dosering:</b>	Voksne: Påsmøres tyndt 1-2 gange daglig.
		<b>Bivirkninger:</b>	Hudkløe brændende fornemmelse i huden, tynd hud, kontakteksem.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato. (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller fryses.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes i åbne sår.
Eczema Psoriasis Itching Sunburns Burning sensation after insect bites	10.7	<b>Active pharmaceutical</b>	Glucocorticoid group II
		<b>Form:</b>	Lotion for external use
		<b>Effect:</b>	Eases inflammations caused by allergic or toxic agents. Antipruritic and analgesic.
		<b>Dosage:</b>	Adults: Apply a thin layer to the skin 1-2 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Pruritic, burning sensation in the skin, thin skin, contact dermatitis
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. Do not refrigerate or freeze
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

## Grp. 11. Desinficerende midler / Disinfectants

Rengøring af: 1. Instrumenter FØR og EFTER brug 2. Hænder 3. Intakt hud	11.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Klorhexidin/ethanol.
		<b>Form:</b>	Væske 0,5%/85%.
		<b>Virkning:</b>	Desinficerende.
		<b>Dosering:</b>	-
		<b>Anmærkninger:</b>	Må ikke anvendes i sår, i øjne eller på slimhinder. Indeholder 85 % alkohol. Se Søfartsstyrelsens Lægebog. Alternativt indkøbes Chlorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Først anvendes Chlorhexidin, derefter Ethanol.
Disinfection of: 1. Instruments BEFORE and AFTER use 2. Hands 3. Intact skin	11.1	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Chlorhexidine/ethanol.
		<b>Form:</b>	Liquid 0.5%/85%.
		<b>Effect:</b>	Disinfective.
		<b>Dosage:</b>	-
		<b>Remarks:</b>	Not be used in wounds, in eyes, or on mucous membranes. Contains 85% alcohol. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual. Alternatively, Chlorhexidine 0.5% and ethanol with a minimum of 70% may be purchased in 2 separate bottles. Use chlorhexidine first and then ethanol
Førstehjælpsbehandling af urene sår Mundskylning	11.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Klorhexidin.
		<b>Form:</b>	Væske 0,2%.
		<b>Virkning:</b>	Desinficerende.
		<b>Dosering:</b>	Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning.
		<b>Anmærkninger:</b>	Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
First aid treatment of dirty wounds Mouth rinse	11.2	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Chlorhexidine.
		<b>Form:</b>	Liquid 0.2%.
		<b>Effect:</b>	Disinfective.
		<b>Dosage:</b>	May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection.
		<b>Remarks:</b>	See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

## Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Forstoppelse	12.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Lactulose (disakkrid af galaktose og fruktose).
		<b>Form:</b>	Saft med 667 mg laktulose per ml.
		<b>Virkning:</b>	Den afførende virkning kan forventes efter 2 - 3 dages behandling. Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres. Fremmer den normale tarmflora. Øger tarmenes bevægelser.
		<b>Dosering:</b>	15 - 30 ml dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Luftudvikling i tarmsystemet. Oppustethed.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Favolax, Orion Corporation).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Undersøg om tilstanden skyldes en sygdom med feber eller mangel på væske FØR anvendelsen. 30 - 50 ml dagligt kan øge insulinbehovet ved diabetikere.
Constipation	12.5	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Lactulose (disaccharide of galactose and fructose).
		<b>Form:</b>	Juice with 667 mg lactulose per ml.
		<b>Effect:</b>	The laxative effect may be expected after 2-3 days treatment. Binds liquids in the intestines so that faeces are softened. Furthers normal intestinal flora. Increases the motility of the intestines.
		<b>Dosage:</b>	15-30 ml daily
		<b>Side-effects:</b>	Intestinal gas. Bloatedness.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Favolax Orion Corporation).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Examine whether the state has been caused by an illness accompanied by fever or a lack of liquids BEFORE use. 30-50 ml a day may increase the need for insulin in diabetic patients.
Diarré	12.6	<b>Lægemiddelstof:</b>	Loperamid.
		<b>Form:</b>	Tabletter à 2 mg.
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer tarmenes bevægelser.
		<b>Dosering:</b>	Start: 2 tabletter. Pause 1 time. Derpå 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Undersøg om den syge har feber. Bør kun anvendes til børn efter <i>Radio Medicals</i> anvisninger. Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diaré hos i øvrigt upåvirkede personer.

**rp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents**

(continued)

Diarrhoea	12.6	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Loperamide.
		<b>Form:</b>	Tablets of 2 mg.
		<b>Effect:</b>	Restricts the motility of the intestines.
		<b>Dosage:</b>	Start: 2 tablets. Wait for 1 hour. 1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily
		<b>Side-effects:</b>	Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal stop.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Examine whether the patient has a fever. Should only be given to children on directions given by Radio Medical. Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected.
Væsketab Salttab Feber tilstande Opkastninger Diarré  MFAG tabel 8, 10, 11.	12.7	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat/natriumcitrat/natriumklorid.
		<b>Form:</b>	Afdelte pulvere.
		<b>Virkning:</b>	Erstatter væske og salte.
		<b>Dosering:</b>	1 pulver oploses i 1 liter kogt, afkølet vand. Basisbehov: 2,5 liter per døgn. For hver grad over 37° C gives yderligere 300 ml per døgn. For hver diarré gives yderligere 200 ml per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Færdig blandet opløsning opbevares i køleskab
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med Radio Medical.
Loss of fluid Loss of salt Feverish conditions Vomiting Diarrhoea  MFAG tables 8, 10, 11	12.7	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium.
		<b>Form:</b>	Divided powder.
		<b>Effect:</b>	Replaces liquids and salts.
		<b>Dosage:</b>	1 powder is dissolved in 1 litre of boiled, cooled water. Basic need: 2.5 litres daily. For every degree above 37° C, the patient is given another 300 ml daily. For every instance of diarrhoea, the patient is given another 200 ml daily
		<b>Side-effects:</b>	None.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. The mixed dissolution should be stored in a cold place.
		<b>Remarks:</b>	Consult Radio Medical.

**Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents**
**(continued)**

Mavesår	12.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Omeprazol
		<b>Form:</b>	Tablet eller kapsel 20 à mg
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer dannelsen af mavesyre
		<b>Dosering:</b>	Mavesår: 20 – 40 mg dagligt. Langtidsbehandling: 10 – 20 mg dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, luft i tarmen. Hovedpine, træthed, svimmelhed, søvnforstyrrelser.
		<b>Holdbarhed:</b>	4 år fra produktionsdato. (Omeprazol, Copyfarm A/S)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan eventuelt kombineres med antibiotika
Stomach ulcer	12.8	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Omeprazol
		<b>Form:</b>	Tablet or capsules of 20 mg
		<b>Effect:</b>	Inhibits gastric acid secretion
		<b>Dosage:</b>	Stomach ulcer: 20-40 mg daily. Long term treatment: 10-20 mg daily.
		<b>Side-effects:</b>	Nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, flatulence, headache, fatigue, dizziness, sleep disturbances.
		<b>Validity:</b>	4 years from the date of production (Omeprazol, Copyfarm A/S)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Can be combined with antibiotics.
Sure opstød Halsbrand	12.9	<b>Lægemiddelstof:</b>	Antacida
		<b>Form:</b>	Tablet eller oral opløsning
		<b>Virkning:</b>	Neutraliserer mavesyre
		<b>Dosering:</b>	Jf. indlægsseddel i præparatet Efter ordination af Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Forstoppelse, diarré
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato ( Alminox®, Nycomed Danmark )
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Acid indigestion Heartburn	12.9	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Antacid
		<b>Form:</b>	Tablet or oral solution
		<b>Effect:</b>	Neutralizes acid in the stomach
		<b>Dosage:</b>	See patients information leaflet. Prescription from Radio Medical
		<b>Side-effects:</b>	Constipation, diarrhoea
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Alminox®, Nycomed Danmark)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents**
**(continued)**

Hæmorerider Kløe ved endetarmen Smerter ved afføring	12.10	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Antihæmoreride creme (skal indeholde glucokortikoid og smertestillende middel)  Salve eller creme.  Lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse med hæmoroider og analrifter.  Voksne: Smøres på 2-3 gange daglig, samt efter afføring.  Anal slimhindeatrofi  3 år fra produktionsdato. (Proctosedyl, 2care4 ApS)  Almindelig temperatur  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Haemorrhoids Itching at the rectum Pain during defecation	12.10	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Anti haemorrhoid ointment (Must contain glucocorticoid and analgesic )  Ointment  Relief of pain, swelling and burning sensation / itching associated with haemorrhoids, anal lacerations.  Apply 2-3 times daily and after defecation  Thin skin in the anus.  3 years from the date of production (Proctosedyl, 2care4 ApS)  Normal temperature.  Consult <i>Radio Medical</i> .
Kvalme Opkastninger  MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.12	<b>Lægemiddelstof:</b>  <b>Form:</b>  <b>Virkning:</b>  <b>Dosering:</b>  <b>Bivirkninger:</b>  <b>Holdbarhed:</b>  <b>Opbevaring:</b>  <b>Anmærkninger:</b>	Domperidon  Tabletter à 10 mg.  Øger mavens og tarmenes bevægelser, hvilket medfører en hurtigere tømning.  10 mg max 3 gange dagligt.  Mundtørhed, døsighed, tristhed, uro og rastløshed.  5 år fra produktionsdato (Motilium®, Janssen -Cilag).  Almindelig temperatur.  Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til børn < 35 kg Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).
Nausea Vomiting  MFAG tables 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.12	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>  <b>Form:</b>  <b>Effect:</b>  <b>Dosage:</b>  <b>Side-effects:</b>  <b>Validity:</b>  <b>Storage:</b>  <b>Remarks:</b>	Domperidon  Tablets of 10 mg.  Increases the motility of the stomach and the intestines causing a faster emptying. Affects the vomiting centre so that the nausea and vomiting decrease.  10 mg maximum three times daily  Dry mouth, drowsiness, sadness, and restlessness.  5 years from the date of production (Motilium® Janssen-Cilag).  Normal temperature.  Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be given to children <35 kg. Only for short use (1 week)

## Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Svejseøjne Lokalbedøvelse af øjet  MFAG tabel 7.	13.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Cinchocain.
<b>Form:</b>		Salve à 5 mg/g.	
<b>Virkning:</b>		Lokalbedøvende.	
<b>Dosering:</b>		1 cm salve bag nederste øjenlåg. Kan gentages efter et par minutter.	
<b>Bivirkninger:</b>		Risiko for maskering af skader eller sygdomme i øjet. Forsinket sårheling.	
<b>Holdbarhed:</b>		2 år fra produktionsdato (Cincain "Ophtha", Ophta).	
<b>Opbevaring:</b>		Almindelig temperatur.	
<b>Anmærkninger:</b>		Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.	
Arc eye / Welders eye Local anaesthetic of the eye  MFAG table 7	13.2	<b>Active pharmaceutical</b>	Cinchocaine.
<b>Form:</b>		Ointment of 5 mg/g.	
<b>Effect:</b>		Local anaesthetic.	
<b>Dosage:</b>		Apply 1 cm of ointment behind the lower eyelid. May be repeated after a couple of minutes.	
<b>Side-effects:</b>		Risk of masking injuries or diseases in the eye. Delayed healing of wounds.	
<b>Validity:</b>		2 years from the date of production (Cinchaine, "Ophtha", Ophta).	
<b>Storage:</b>		Normal temperature.	
<b>Remarks:</b>		Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.	
Grøn stær: Smerter i øjet, Regnbuesyn Tågesyn	13.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Pilocarpin.
<b>Form:</b>		Dråber à 20 mg/ml.	
<b>Virkning:</b>		Nedsætter trykket i det indre øje.	
<b>Dosering:</b>		Hyppig drypning bag nederste øjenlåg efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .	
<b>Bivirkninger:</b>		Sammentrækning i pupillens lakkemuskel ("knappenålspupil") og hovedpine.	
<b>Holdbarhed:</b>		1½ år fra produktionsdato (Pilocarpin "ophtha"®, Ophtha A/S) Må højst anvendes 1 måned efter åbning.	
<b>Opbevaring:</b>		Almindelig temperatur.	
<b>Anmærkninger:</b>		Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.	
Glaucoma: Pains in the eye, Rainbow vision, Blurred vision	13.4	<b>Active pharmaceutical ingredients:</b>	Pilocarpine.
<b>Form:</b>		Eye drops of 20 mg/ml.	
<b>Effect:</b>		Reduces pressure inside the eye.	
<b>Dosage:</b>		Frequent drops behind the lower eyelid after prescription from <i>Radio Medical</i> .	
<b>Side-effects:</b>		Spasms of the sphincter of the pupil ("pin-hole pupil") and headache.	
<b>Validity:</b>		1½ years from the date of production (Pilocarpin "ophtha"®, Ophtha A/S). To be use within 1 month, from opening the package.	
<b>Storage:</b>		Normal temperature.	
<b>Remarks:</b>		Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.	

**Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears**
**(continued)**

Øjenbetændelse Betændelse i øjenlåg og øjets omgivelser. Forebyggelse af betændelse efter øjenundersøgelse og fjernelse af fremmedlegemer.  MFAG appendiks 7.	13.8	<b>Lægemiddelstof:</b>	Fusidin
		<b>Form:</b>	Øjendråber / øjen gel 1%
		<b>Virkning:</b>	Bakteriedræbende
		<b>Dosering:</b>	1 dråbe x 2 dagligt
		<b>Bivirkninger:</b>	Øjenirritation, øjenkløe og rødme
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato, (Fucithalmic, 2care4 ApS)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Inflammation of the eyes. Inflammation of the eyelid, and the surroundings of the eye. Prevention of inflammation of the eyes after removal of foreign bodies.  MFAG appendiks 7	13.8	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Fusidin
		<b>Form:</b>	Eye drops / Eye gel 1 %
		<b>Effect:</b>	Kills bacteria
		<b>Dosage:</b>	1 drop twice daily
		<b>Side-effects:</b>	Irritation of the eye, eye itching and blushing.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Fucithalmic, 2care4 ApS)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used in connection with contact lenses
Lokal inflammatoriske øjenbehandling Øregangseksesten	13.10	<b>Lægemiddelstof:</b>	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.
		<b>Form:</b>	Øjendråber 15+5+1 mg/ml
		<b>Virkning:</b>	Hæmmer baktierievækst og modvirker kløe
		<b>Dosering:</b>	Øjendråber: 1 dråbe 3 gange dagligt Øredråber: 2-4 dråber 3 gange dagligt i øregange
		<b>Bivirkninger:</b>	Lokal irritation. Forøgelse af trykket i øjet
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb. Pfizer) Må anvendes en måned efter åbning
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må aldrig anvendes i øregang, dersom der er mistanke om perforeret trommehinde.
Inflammatory eye treatment Ear Eczema	13.10	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B comb.
		<b>Form:</b>	Eye drops 15+5+1 mg/ml
		<b>Effect:</b>	Inhibits bacterial growth and inhibits itching
		<b>Dosage:</b>	Eye drops: 1 drop three times a day Ear drops: 2-4 drops three times daily in the ear canal
		<b>Side-effects:</b>	Local irritation. Increasing the pressure in the eye
		<b>Validity:</b>	2 years from date of production (Hydrocortisone with Terramycin® and Polymyxin B comb. Pfizer) May be used a month after opening
		<b>Storage:</b>	Normal temperature
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Never use in the ear canal, where it is suspected perforated eardrum.

#### Grp. 14. Gynækologiske midler / Gynaecological agents

Blødning EFTER abort eller fødsel	14.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Methylergometrin.
		<b>Form:</b>	Tabletter á 0,125 mg.
		<b>Virkning:</b>	Livmodersammentrækkende.
		<b>Dosering:</b>	Efter abort eller fødsel: 0,125 - 0,250 mg 3 gange dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslet.
		<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må ikke anvendes til gravide med blødninger.
Bleeding AFTER giving birth or miscarriage	14.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Methylergometrine.
		<b>Form:</b>	Tablets of 0,125 mg.
		<b>Effect:</b>	Contracts the uterus.
		<b>Dosage:</b>	After giving birth or miscarriage: 0.125-0.250 mg three times daily
		<b>Side-effects:</b>	Allergy, headache, stomach ache, high blood pressure, rash.
		<b>Validity:</b>	5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used by pregnant women who are bleeding.

#### Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

Hostestillende	15.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Dextromethorphan.
		<b>Form:</b>	Tabletter á 30 mg
		<b>Virkning:</b>	Hostestillende.
		<b>Dosering:</b>	15-30 mg. 3-4 gange daglig
		<b>Bivirkninger:</b>	Ufrivillige muskelsammentrækning, døsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Bør ikke anvendes af børn under 6 år Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.7 Metronidazol. Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®)
Cough	15.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Dextromethorphan.
		<b>Form:</b>	Tablets of 30 mg
		<b>Effect:</b>	Reduces coughs.
		<b>Dosage:</b>	15 – 30 mg. 3-4 times daily
		<b>Side-effects:</b>	Unvoluntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used by children under the age of 6 years Should not be used during concomitant treatment or 7.7 Metronidazole. Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse ®)

**Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma**

(continued)

Førstevalg ved astma og astmalignende vejtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.	15.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Terbutalin.
Truende for tidlig fødsel.		<b>Form:</b>	Pulver i turbuhaler. 0,5 mg per dosis.
MFAG tabel 9		<b>Virkning:</b>	Løsner kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
		<b>Dosering:</b>	1 dosis efter behov. Højst 6 gange dagligt.
		<b>Bivirkninger:</b>	Muskelrystelser og hurtig puls. Nældefeber. Rødt hududslet.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Bricanyl® Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Opbevares tørt.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Hvis virkningen udebliver forsøges med 15.3. Hvis vejtrækningen bedres fortsæt med 4.3.
First choice of medicament in case of asthma and asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.	15.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Terbutaline.
Imminent premature birth		<b>Form:</b>	Powder, turbuhaler. 0.5 mg per dosage.
MFAG table 9		<b>Effect:</b>	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
		<b>Dosage:</b>	1 dose as required. Maximum six times daily
		<b>Side-effects:</b>	Muscle contractions and rapid pulse. Urticaria. Red rash.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Bricanyl®, Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be stored in a dry place.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . If there is no effect, try remedy 15.3. If respiration is improved, continue with remedy 15.4 or 4.3.
Astma og astmalignende vejtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.	15.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Terbutalin.
Truende for tidlig fødsel.		<b>Form:</b>	Injektionsvæske 0,5 mg/ml, ampuller à 1 ml til subcutan eller intramuskulær injektion.
		<b>Virkning:</b>	Løsner kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
		<b>Dosering:</b>	Akut: 0,5 mg indgives subcutant eller intramuskulært. Kan gentages.
		<b>Bivirkninger:</b>	Muskelrystelser og hurtig puls. Nældefeber. Rødt hududslet.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Bricanyl®, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur. Beskyttet mod lys.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Behandlingen fortsættes med 4.3.
Asthma and asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.	15.3	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Terbutaline.
Imminent premature birth		<b>Form:</b>	Injection liquid 0.5 mg/ml, ampoules of 1 ml.
		<b>Effect:</b>	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
		<b>Dosage:</b>	Acute: 0.5 mg given subcutaneously or intramuscularly. May be repeated.
		<b>Side-effects:</b>	Muscle contractions and rapid pulse. Urticaria. Red
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Bricanyl®, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature. To be protected from light.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . The treatment is continued by 4.3

**Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma**
(continued)

Astma og astmalignende vejtrækning som følge af udsættelse for røg, gas- arter og damp.  MFAG tabel 9	15.4	<b>Lægemiddelstof:</b>	Budesonid.
		<b>Form:</b>	Pulver i turbuhaler. 200 µg per dosis.
		<b>Virkning:</b>	Fjerner inflammatorisk hævelse i luftvejene.
		<b>Dosering:</b>	1 dosis efter behov. Højst 8 gange per døgn.
		<b>Bivirkninger:</b>	Overfølsomhedsreaktioner.
		<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdato (Spirocort® Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Budesonid anvendes efter effekt er opnået med terbutalin (15.2).
		<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Budesonide.
Asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.  MFAG table 9	15.4	<b>Form:</b>	Powder. Turbuhaler. 200 µg per dose.
		<b>Effect:</b>	Removes inflammatory swelling of the respiratory tract.
		<b>Dosage:</b>	1 dose as required. Maximum eight times daily.
		<b>Side-effects:</b>	Allergic reactions.
		<b>Validity:</b>	2 years from the date of production (Spirocort®, Turbuhaler, AstraZeneca).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . Budesonide is used when an effect has been achieved by terbutaline (15.2).
		<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Xylometazolin.
		<b>Form:</b>	Næsedråber/næsespray. 1 mg/ml.
Forkølelse Bihulebetændelse Kæbehulebetændelse Pandehulebetændelse Mellemørebetændelse	15.5	<b>Virkning:</b>	Skaffer afløb fra mellemøret,bihuler,pandehuler og kæbehuler. Virker øjeblikkeligt og i 10 - 12 timer.
		<b>Dosering:</b>	2 pust/dråber i hvert næsebor 2 - 3 gange dagligt i maksimum 10 dage.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ved længere tids anvendelse kan stoffet skade næsens slimhinder.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Må ikke anvendes ved symptomer på grøn stær (se 13.4).
		<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Xylometazoline.
		<b>Form:</b>	Nose drops/nose spray. 1 mg/ml.
		<b>Effect:</b>	Opens drainage from middle ears and sinuses. Takes effect immediately and stays effective for 10-12 hours.
Cold Sinusitis Maxillary sinusitis Frontal sinusitis Otitis media	15.5	<b>Dosage:</b>	2 sprays/drops in each nostril two-three times daily for a maximum of ten days.
		<b>Side-effects:</b>	If used for a long period, the substance may damage the mucous membranes of the nose.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Not to be used if there are symptoms of glaucoma
		<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	
		<b>Form:</b>	
		<b>Effect:</b>	
		<b>Dosage:</b>	

## Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar

1. valgs præparat ved: Blodtab Væsketab Forebyggelse af shock  MFAG tabel 7	16.1	<b>Lægemiddelstof:</b>	Natriumklorid.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske 9 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		<b>Virkning:</b>	Erstatter væske og salte.
		<b>Dosering:</b>	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid isotonisk, Frenius Kabi).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4).
First choice of medicament in case of: Loss of blood Loss of liquid Prevention of shock  MFAG table 7	16.1	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Sodium chloride
		<b>Form:</b>	Infusion liquid 9 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Replaces liquids and salts.
		<b>Dosage:</b>	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		<b>Side-effects:</b>	None relevant.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Sodium chloride, Frenius Kabi).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4).
Ernæringserstatning Væsketab  (Se også 12.7)	16.2	<b>Lægemiddelstof:</b>	Glucose og natriumklorid.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske med glucose 25 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		<b>Virkning:</b>	Erstatter væske, glucose og salte.
		<b>Dosering:</b>	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5).

**Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar**
**(continued)**

Food substitute Loss of liquids  (See also 12.7)	16.2	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Glucose and sodium chloride.
		<b>Form:</b>	Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Replaces liquids, glucose and salts.
		<b>Dosage:</b>	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		<b>Side-effects:</b>	None relevant.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4).
2. valgs præparat ved: Blodtab Shock eller risiko for shock, når årsagen er et akut blodtab  MFAG tabel 13	16.3	<b>Lægemiddelstof:</b>	Hydroxyethylstivelse.
		<b>Form:</b>	Infusionsvæske 60 mg/ml. Beholdere à 500 ml til intravenøs anvendelse.
		<b>Virkning:</b>	Udvider plasmavolumenet svarende til den indgivne mængde.
		<b>Dosering:</b>	Efter ordination fra <i>Radio Medical</i> . Normalt ikke over 500 - 1000 ml per <i>døgn</i> . På grund af risikoen for overfølsomhedsshock indgives de første 10 - 20 ml under stor forsigtighed og nøje observation. Ved overfyldning af kredsløbet indgives Furosemid (9.5).
		<b>Bivirkninger:</b>	Allergiske reaktioner. Overfølsomhedsshock.
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Voluven®, Frenius Kabi).
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur.
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of: Loss of blood Shock or risk of shock caused by an acute loss of blood  MFAG tabel13	16.3	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Hydroxyethyl amyloid.
		<b>Form:</b>	Infusion liquid 60 mg/ml. Containers of 500 ml for intravenous use.
		<b>Effect:</b>	Enlarges the plasma volume equivalent to the amount infused.
		<b>Dosage:</b>	After ordination from <i>Radio Medical</i> . Normally, not more than 500-1000 ml a <i>day</i> . Because of the risk of allergic shock, the first 10-20 ml are infused very carefully and under close observation. If overloading including oedema of the lungs occurs: Give Furosemide (9.5).
		<b>Side-effects:</b>	Allergic reactions. Allergic shock.
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Voluven®, Frenius Kabi).
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

**Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar**
**(continued)**

Væske til gennemsyning af intravenøs kanyle. Sårbehandling. Øjenbehandling	16.5	<b>Lægemiddelstof:</b>	Natriumklorid
		<b>Form:</b>	Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder
		<b>Virkning:</b>	Fjerner blod fra venekanyle, renser sår og øjne
		<b>Dosering:</b>	Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra Radio Medical
		<b>Bivirkninger:</b>	Ingen relevante
		<b>Holdbarhed:</b>	3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi)
		<b>Opbevaring:</b>	Almindelig temperatur
		<b>Anmærkninger:</b>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Fluid for flushing intravenous needle. Treatment of wounds. Treatment of eyes	16.5	<b>Active Pharmaceutical ingredients:</b>	Sodium chloride
		<b>Form:</b>	Fluid 0,9 % in containers of 20 ml
		<b>Effect:</b>	Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes
		<b>Dosage:</b>	See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from Radio Medical.
		<b>Side-effects:</b>	No relevant ones
		<b>Validity:</b>	3 years from the date of production (Fresenius Kabi)
		<b>Storage:</b>	Normal temperature.
		<b>Remarks:</b>	Consult <i>Radio Medical</i> .

# **Fortegnelse og kontroldokument over lægemiddelstoffer**

**Inventory and Control Document  
of Active Pharmaceutical Ingredients**

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
<b>Grp. 1 Ilt / Oxygen</b>						
1.1(π)	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	-	0	40 l / 200 bar
1.1(π)	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas	-	0	40 l / 200 bar
1.3(π)	V03AN01	Medicinsk ilt passende til A.1 (se note)	Gas	-	2 x 2 l / 200 bar	0
1.3(π)	V03AN01	Oxygen Medical suitable to A.1 (see note)	Gas	-	2 x 2 l / 200 bar	0
1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1						
<b>Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic</b>						
2.1(π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	10 mg/ ml	5 x 10 ml	0
2.1(π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Liquid	10 mg/ ml	5 x 10 ml	0
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	2 %	30 g	0
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	2 %	30 g	0
<b>Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics</b>						
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	500 mg	100 stk.	0
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	500 mg	100 pcs.	0
3.2(π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	400 mg	30 stk.	0
3.2(π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	400 mg	30 pcs.	0
3.4(π)	N02AA01	Morfin △	Inj. Væske	10 mg / ml	10 x 1 ml	0
3.4(π)	N02AA01	Morphine △	Inj. Liquid	10 mg / ml	10 x 1 ml	0
3.5(π)	N02AX02	Tramadol △	Tablet / Kapsel	50 mg	50 stk.	0
3.5(π)	N02AX02	Tramadole △	Tablets / Capsula	50 mg	50 pcs.	0
<b>Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness</b>						
4.1(π)	C01CA24	Adrenalin "K"	Inj. Væske	1 mg / ml	5 x 1ml	0
4.1(π)	C01CA24	Epinephrine "R"	Inj. Liquid	1 mg / ml	5 x 1ml	0
4.2(π)	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	8 mg	12 pcs.	0
4.2(π)	R06AX18	Acrivastine	Capsula	8 mg	12 pcs.	0
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortison	Inj. pulver + væske	100 mg	1 hætteglas	0
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	Inj. Subst + solvens	100 mg	1 vials	0
4.5	N07CA02	Cinnarizin △	Tablet	25 mg	50 stk.	0
4.5	N07CA02	Cinnarizine △	Tablets	25 mg	50 pcs.	0

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutecal Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quentety B	MFAG B
<b>Grp. 5 Antidoter / Antidotes</b>						
5.1(π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	0,4 mg /ml	5 x 1 ml	0
5.1(π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	0,4 mg /ml	5 x 1 ml	0
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "K" (se note)	Inj. pulver + væske	1 mg	0	0
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "R" (see note)	Inj. Subst + solvens	1 mg	0	0
5.3(π)	A03BA01	Atropin	Inj. Væske	1mg/ml	0	15 x 1ml
5.3(π)	A03BA01	Atropine	Inj. Liquid	1mg/ml	0	15 x 1ml
5.4(π)	D11AX03	Calcium gluconate	Gel	2%	0	5 x 25 g
5.4(π)	D11AX03	Calcium gluconate	Gel	2%	0	5 x 25 g
5.5(π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Brusetablet	500 mg	0	40 stk
5.5(π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Effervescent tablet	500 mg	0	40 pcs.
5.6	A07BA01	Aktivt kul	Pulver	50 g	0	2 x 50 g
5.6	A07BA01	Charcoal, activated	Powder	50 g	0	2 x 50 g
5.7	-	Ethyl alkohol	Væske	99.9%	0	1 x 500 ml
5.7	-	Ethyl alcohol	Liquid	99.9%	0	1 x 500 ml
5.2: 1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge / 1 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.						
<b>Grp. 6 Akut sindsyge og kramper / Mental disorder and convulsion</b>						
6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	5 mg	25 stk.	0
6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	5 mg	25 pcs.	0
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	4 mg / ml	5 x 2½ ml	0
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	4 mg / ml	5 x 2½ ml	0
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	5 mg / ml	5 x 1 ml	0
6.4(π)	N05AD01	Haloperidole Δ	Inj. Liquid	5 mg / ml	5 x 1 ml	0
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	10 mg	10 stk.	0
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	10 mg	10 pcs.	0
<b>Grp. 7 Infektioner / Infections</b>						
7.1(π)	J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	Tablet	660 - 800 mg	100 stk.	0
7.1(π)	J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	Tablets	660 - 800 mg	100 pcs.	0
7.4(π)	J01FA01	Erythromycin	Tablet	500 mg	30 stk.	0
7.4(π)	J01FA01	Erythromycin	Tablets	500 mg	30 pcs.	0
7.7(π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	500 mg	20 stk.	0
7.7(π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	500 mg	20 pcs.	0
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	250 mg	20 stk.	0
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	250 mg	20 pcs.	0
7.10(π)	J07AM01	Tetanus vaccine "K"	Inj. Væske	40 IU.	1 x 1 ml	0
7.10(π)	J07AM01	Tetanus vaccine "R"	Inj. Liquid	40 IU.	1 x 1 ml	0
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	250 IU.	1 x 1 ml	0
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	250 IU.	1 x 1 ml	0
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	500 mg	50 stk.	0
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	500 mg	50 pcs.	0
7.13(π)	J01EE01	Sulfamethoxazol + trimitroprim	Tablet	400 / 80 mg	24 stk.	0
7.13(π)	J01EE01	Sulfamethoxazol + trimitroprim	Tablets	400 / 80 mg	24 pcs.	0

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
<b>Grp. 9 Hjerte / Cardiac</b>						
9.1	C01DA02	Glycerylnitrate	Mund spray	0,4 mg/dose	1x200 doser	0
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/dose	1x200 doses	0
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	150 mg	100 stk.	0
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablet	150 mg	100 pcs.	0
9.4(π)	C03CA01	Eurosemid	Tablet	40 mg	50 stk.	0
9.4(π)	C03CA01	Eurosemide	Tablet	40 mg	50 pcs.	0
<b>Grp. 10 Hud / Skin</b>						
10.4	D06BA01	Sølvsulfadiazin	Creme	1%	50 g	0
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion/Cream	1%	50 g	0
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml	0
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml	0
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Creme	Gruppe II	30 g	0
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion/Cream	Group II	30 g	0
<b>Grp. 11 Desinficering / Disinfectants</b>						
11.1	-	Klorhexidine/ethanol (se note)	Væske	0.5/85%	175 ml	0
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol (see note)	Liquid	0.5/85%	175 ml	0
11.2	-	Klorhexidine	Væske	0.2 %	4 x 250 ml	0
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	0.2 %	4 x 250 ml	0
11.1: Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1						
<b>Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal</b>						
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	667 mg/ml	100 ml	0
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	667 mg/ml	100 ml	0
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	2 mg	10 stk.	0
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	2 mg	10 pcs.	0
12.7	-	Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat/natriumcitrat/natriumklorid.	Powder	30/1,1/0,11/2,1 g/pulver	0	6 x 20,5 g
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	30/1,1/0,11/2,1 g/powder	0	6 x 20,5 g
12.8(π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet/Kapsel	20 mg	28 stk..	0
12.8(π)	A02BC01	Omeprazole	Tablets/Capsula	20 mg	28 pcs.	0
12.9	A02A	Antacida	Tablet eller oral oplosning	-	20 stk.eller 250 ml	0
12.9	A02A	Antacid	Tablet or oral solution	-	20 pcs. or 250 ml	0
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)	Creme/Salve	-	30 g	0
12.10	C05A	Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)	Lotion/Ointment	-	30 g	0
12.12(π)	A03FA03	Domperidon (se note)	Tablet	10 mg	30 pcs.	0
12.12(π)	A03FA03	Domperidone (see note)	Tablets	10 mg	30 pcs.	0
12.12 Erstatter, den i MFAG nævnte, supp. Metroclopramid / Replaces the supp. Metoclopramide described in MFAG.						

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Phanaceutecal Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quentety B	MFAG B
<b>Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears</b>						
13.2(π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	0,50%	2 x 1g	3 x 1 g
13.2(π)	S01HA06	Cinchocaine	Oinment	0,50%	2 x 1g	3 x 1 g
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2%	10 ml	0
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2%	10 ml	0
13.8(π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	1%	2 x 5g	0
13.8(π)	S01AA13	Fusidin	Eye drops / gel	1%	2 x 5g	0
13.10(π)	D07CA01	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.	Dråber	15+5+1 mg/ml	5 ml	0
13.10(π)	D07CA01	Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B Comb	Drops	15+5+1 mg/ml	5 ml	0
<b>Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology</b>						
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	0,125 mg	10 pcs.	0
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	0,125 mg	10 pcs.	0
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord./ shall only be available IF women on board.						
<b>Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold</b>						
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	20 stk.	0
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablets	30 mg	20 pcs.	0
15.2(π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doser	100 doser
15.2(π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doses	100 doses
15.4(π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	0	5 x 100 doser
15.4(π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	0	5 x 100 doses
15.5(π)	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	1 mg / ml	10 ml	0
15.5(π)	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	1 mg / ml	10 ml	0
<b>Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)</b>						
16.1(π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	0	3 x 1 liter
16.1(π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	0	3 x 1 litre
16.2(π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	3 x 1 liter	0
16.2(π)	B05BB02	Glucose + sodium chloride	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	3 x 1 litre	0
16.3(π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	60 mg/ml	500 ml	2 x 500 ml
16.3(π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	60 mg/ml	500 ml	2 x 500 ml
16.5(π)	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	0.9 %	20 x 20 ml	0
16.5(π)	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml	0
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder / Infusion liquids may not be in glass container						

#### Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine

#### Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine

# **Fortegnelse og kontroldokument over medicinsk udstyr**

# **Inventory and Control Document of Medical Equipment**

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety B	MFAG B
<b>A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment</b>			
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)	1 sæt	0
A.1	Mobile resuscitation equipment (see note)	1 set	0
A.4	Tungeholdere, størrelse 2	0	2 stk.
A.4	Guidel airway, size 2	0	2 pcs.
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	1 stk.	1 stk.
A.5	Guidel airway, size 3	1 pcs.	1 pc.
A.6	Tungeholdere, størrelse 4	0	2 stk.
A.6	Guidel airway, size 4	0	2 pcs.
A.7	Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske	0	1 stk.
A.7	Extra ventilation bag with valve and mask	0	1 pc.
A.8	Kraftig klædesaks	1 stk.	0
A.8	Strong scissors for clothes	1 pcs.	0
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	2 stk.	0
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	2 pcs.	0
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	1 stk.	0
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	1 pcs.	0
A.13	Hudson maske med reservoipse med ca. 1,8 m slange	1 stk.	9 stk.
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	1 pcs.	9 pcs.

A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1

<b>B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape</b>			
B.2	Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	10 stk.	0
B.2	Sterile gaze compress, approx.10 x10 cm, approx. 8 layers	10 pcs.	0
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	3 stk.	0
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	3 pcs.	0
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet	1 x 10 stk.	0
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet	1 x 10 pcs.	0
B.6	Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	1 stk.	0
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm	1 pcs.	0
B.7	Gaveziskers, usterile	100 stk.	0
B.7	Gauze swaps, non-sterile	100 pcs.	0
B.8	Tubegaze til fingerforbindinger	2 stk.	0
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	2 pcs.	0
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m	5 ruller	0
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m	5 rolls	0
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	1 pakke	0
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	1 pack	0
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	2 pakker	0
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	2 packs	0
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	1 rulle	0
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	1 roll	0
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	1 ruller	0
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	1 rolls	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety B	MFAG B
<b>C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation</b>			
C.1	Engangshandsker af latex, uesterile, X-large	20 stk.	0
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	20 pcs.	0
C.2	Engangshandsker af latex, uesterile, large	20 stk.	0
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	20 pcs.	0
C.5	Vaskesvampe, éngangs	25 stk.	0
C.5	Bath sponge, disposable	25 pcs.	0
C.6	Beskyttelsesbriller	1 stk.	0
C.6	Protective goggles	1 pcs.	0
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	2 stk.	0
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	2 pcs.	0
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	250 ml	0
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	250 ml	0
<b>D. Sårbehandling / Treatment of wounds</b>			
D.1	Suturtape, Steri-StripTM	10 stk	0
D.1	Suturtape, Steri-StripTM	10 pcs.	0
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	6 stk.	0
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	6 pcs.	0
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	1 stk.	0
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x3 cm	1 pcs.	0
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.	0
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pcs.	0
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	1 stk.	0
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	1 pcs.	0
D.11	Splintpincet	1 stk.	0
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	1 pc.	0
D.12	Pean, krum	1 stk.	0
D.12	Pean, curved	1 pcs.	0
D.13	Nåleholder	1 stk.	0
D.13	Suture - holder	1 pcs.	0
D.14	Barbermaskine (skraber), éngangs	1 stk.	0
D.14	Safety razor, disposable single use	1 pc.	0
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	4 stk.	0
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	4 pcs.	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety B	MFAG B
<b>E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion</b>			
E.1	Kanylebøtte	1 stk.	0
E.1	Box for contaminated needles	1 pcs.	0
E.2	Afspritningssvaps m. isopropylalkohol 70%	50 stk.	0
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%	50 pcs.	0
E.3	Staserem	1 stk.	0
E.3	Torniquet	1 pcs.	0
E.4	Optiva*2 , intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g (se note)	5 stk.	5 stk.
E.4	Optiva*2 , intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g (see note)	5 pcs.	5 pcs.
E.5	Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle	5 stk.	5 stk.
E.5	Vecafix®, fixing plaster for intraveneos needle	5 pcs.	5 pcs.
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (se note)	10 stk.	40 stk.
E.6	Needle, sterile, disposable single use, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (see note)	10 pcs.	40 pcs.
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	5 stk.	45 stk.
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	5 pcs.	45 pcs.
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	5 stk.	5 stk.
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	5 pcs.	5 stk
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, steril til engangsbrug	2 stk.	5 stk.
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	2 pcs.	5 pcs.

**E.4+E.6:** Kanyle i kaliber 0,8 og intravenøs kanyle kaliber 1,2, som beskrevet i MFAG, er erstattet af kanyle i kaliber 0,6 og intravenøs kanyle kaliber 1,1.

**E.4+E.6:** Needles size 0.8 and intravenous cannula size 1.2, as described in MFAG, are replaced with needles size 0.6 and intravenous cannula size 1.1

<b>F. Udstyr til medicinskundersøgelse / Equipment for medical examination</b>			
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.	0
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pcs.	0
F.2	Stetoskop	1 stk.	0
F.2	Stethoscope	1 pcs.	0
F.3	Digitalt lægetermometer	1 stk.	0
F.3	Digital clinical thermometer	1 pcs.	0
F.4	Pencillygte m. batterier	1 stk.	0
F.4	Pencil lamp w/batteries	1 pcs.	0
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	5 stk.	0
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	5 pcs.	0
F.6	Pandelampe	1 stl.	0
F.6	Head lamp	1 pcs.	0

<b>H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment</b>			
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	1 stk.	0
H.1	Lamp with UV light w/batteries	1 pc.	0
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	10 stk.	0
H.2	Fluorescent colour for the eye	10 pcs.	0
H.3	Vatpinde, steril	20 stk.	0
H.3	Cotton sticks, sterile	20 pcs.	0
H.5	Øjenklap	1 stk.	0
H.5	Eye patch	1 pcs.	0
H.6	Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	4 stk.	0
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	4 pcs.	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety B	MFAG B
<b>I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder</b>			
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	2 stk.	0
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	2 pcs.	0
I.2	Urinkolbe, plastic	1 stk.	0
I.2	Bed bottle, plastic	1 pcs.	0
<b>J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures</b>			
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	1 stk.	0
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	1 pcs.	0
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	1 stk.	0
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	1 pcs.	0
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	1 stk.	0
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	1 pcs.	0
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	2 stk.	0
J.4	Triangular scarf (Mitella)	2 pcs.	0
J.5	Sikkerhedsnåle	12 stk.	0
J.5	Safety pins	12 pcs.	0
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	2 stk.	0
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	2 pcs.	0
J.10	Fikséringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	1 rulle	0
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	1 roll	0
<b>K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation</b>			
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	1 stk.	0
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	1 pcs.	0
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	1 stk.	0
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	1 pcs.	0
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	1 stk.	0
K.4	Stiff neck collar, adjustable	1 pcs.	0
<b>M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing</b>			
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	10 stk.	0
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	10 pcs.	0
<b>O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.</b>			
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for søfarende	1 stk.	0
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth	1 pcs.	0
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B	1 stk	0
O.3	Inventory, Control document and Userinstruction Category B MFAG B	1 pcs.	0
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.	0
O.5	Radio Medical Records	1 pcs.	0
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	0	1 stk.
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	0	1 pc.

O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.

O.3 must be available in digital or printed version.

# **Labels**

<p><b>1.1 Gas / Gas</b>  <b>Medicinsk Ilt / Medical Oxygen</b>  Indikation / Indication: Bevidstløse uden vejtrækning, Bevidstløse med vejtrækning, Medtaget almen tilstand.  Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejtrækningsbesvær / Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing.  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperaturen under 50°C / Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C</p>	<p><b>4.5 tablet / tablet Δ</b>  <b>Cinnarizin 25 mg</b>  Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>2.1 inj. væske / inj. liquid</b>  <b>Lidocain 10 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.1 inj. væske / inj. liquid</b>  <b>Naloxone 0,4 mg/ml</b>  Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote  MFAG tables 4, 13  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>2.2 gel / gel</b>  <b>Lidocain 2%</b>  Indikation/Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.3 inj. væske / inj. liquid</b>  <b>Atropin 1 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG table 17  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>3.1 tablet / tablet</b>  <b>Paracetamol 500 mg</b>  Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain; MFAG tables 7, 8,13  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.4 gel / gel</b>  <b>Calcium gluconate 2 %</b>  Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG table 8, 16  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>3.2 tablet / tablet</b>  <b>Ibuprofen 400 mg</b>  Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.5 tablet / tablet</b>  <b>Calciumlactogluconate 500 mg</b>  Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG tables 16  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>3.4 inj.væske / inj.liquid Δ</b>  <b>Morfin 10 mg/ ml</b>  Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain;  MFAG tables 7,8, 10,13  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.6 afdelt pulver / powder</b>  <b>Aktivt kul / Activated charcoal</b>  Indikation / Indication: Antidot / Antidote/ MFAG table 10  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>3.5 kapsel / capsule Δ</b>  <b>Tramadol 50 mg</b>  Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>5.7 væske / liquid</b>  <b>Ethyl alcohol 99,5%</b>  Indikation/Indication: Antidot / Antidote/ MFAG table 19  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>4.1 inj.væske / inj.liquid</b>  <b>Adrenalin 1 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage:2- 8°C</p>	<p><b>6.2 tablet / tablet Δ</b>  <b>Diazepam 5 mg</b>  Indikation / Indication: Angst / Anxiety  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>4.2 kapsel / capsule</b>  <b>Acrivastin 8 mg</b>  Indikation / Indication: Allergi / Allergy  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>6.3 klysma / enema Δ</b>  <b>Diazepam 4 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Kramper / Convulsions; MFAG tables 4, 5, 6  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p><b>4.3 inj.væske / inj.liquid</b>  <b>Hydrocortisonsuccinat 100 mg/2 ml</b> Indikation / Indication: Allergi / Allergy  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p><b>6.4 inj.væske / inj liquid Δ</b>  <b>Haloperidol 5 mg/ml</b>  Indikation / Indication: Sindsyge / Mental disease  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
	<p><b>6.5 tablet / tablet Δ</b>  <b>Zolpidem 10 mg</b>  Indikation / Indication: Søvnsløshed / insomnia  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

7.1 tablet / tablet <b>Phenoxytmethylpenicillin</b> 660 - 800 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	10.4 creme / cream <b>Sølvsulfadiazin / Silver sulfadiazine</b> 1% Indikation / Indication: Brandsår / Burns Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.4 tablet / tablet <b>Erythromycin</b> 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	10.6 shampoo / shampoo <b>Permethrin</b> 1% Indikation / Indication: Lus / Lice Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.7 suppositorie / suppository <b>Metronidazol</b> 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	10.7 creme / lotion <b>Glukokortikoid gruppe II /glucocorticoid group II</b> Indikation / Indication: Eksem / Eczema Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.8 tablet / tablet <b>Ciprofloxacin</b> 250 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	11.1 væske / liquid <b>Chlorhexidin / Ethanol</b> 0,5%/85% Indikation / Indication: Desinfektion af instrumenter / Disinfection of instruments Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.10 vaccine / vaccine <b>Tetanus</b> > 40 IE/ml Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C	11.2 væske / liquid <b>Chlorhexidin</b> 0,2% Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse. Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.11 immunglobulin / immunglobuline <b>Tetanus</b> 250 IE/ml Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C	11.5 væske / liquid <b>Lactulose</b> 667 mg/ml Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.12 tablet / tablet <b>Flucloxacillin</b> 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	12.6 tablet / tablet <b>Loperamid</b> 2 mg Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.13 tablet / tablet <b>Sulfamethoxazol+trimotiprim</b> 400mg + 80 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	12.7 pulver / powder <b>Glucose / kalium / magnesium / natrium citrat/natrium/ Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium</b> 30/1,1/0,11/2,1 g/enhed Indikation / Indication: Væske- og salttab / Rehydration MFAG table 8, Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.1 spray / aerosol <b>Glycerylnitrat</b> 0,4 mg/dose Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2 - 25°C	12.8 kapsler / capsule <b>Omeprazol</b> 20 mg Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.3 tablet / tablet <b>Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid</b> 150 mg Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	12.9 tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution <b>Antacida</b> Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.4 tablet / tablet <b>Furosemid</b> 40 mg Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature	12.10 rektalsalve / rectal ointment <b>Hæmoride creme / Anti haemorrhoid agent</b> Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruitisRef: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 25 C

<p>12.12 Tablet / Tablet  <b>Domperidon</b> 10 mg  Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting  MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>	<p>15.2 turbuhaler / turbuhaler  <b>Terbutalin</b> 0,5 mg/dose  Indikation / Indication: Astma / Asthma  MFAG table 9  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.2 øjensalve / eyeointment  <b>Cinchocain</b> 5 mg/g  Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye;  MFAG table Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>15.4 turbuhaler / turbuhaler  <b>Budesonid</b> 0,2 mg/dose  Indikation / Indication: Astma / Asthma; MFAG table 9  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.4 øjendråber / eyedrops  <b>Pilocarpin</b> 20 mg/ml  Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops  <b>Xylometazolin</b> 1 mg/ml  Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.8 øjendråber / eyedrops  <b>Fusidinsyre</b> 10mg/g i/in 5g tube  Indikation: Øjeninfiamtion / Inflammation of eye  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read user instruction in the inventory.  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur</p>	<p>16.1 inf.væske / inf.liquid  <b>Natriumklorid / sodium chloride</b> 9 mg/ml  Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood; MFAG table 7  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.10 øjendråber / eyedrops  <b>Hydrocortison med/with Terramycin® og Polymyxin-B Comb</b>  Indikation / Indication: Øjeninfiamtion / Inflammation of eye  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>16.2 inf.væske / inf.liquid  <b>Glucose og natrium / glucose and sodium</b> 25/4,5 mg/ml  Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>14.2 tablet / tablet  <b>Methylergometrin</b> 0,125 mg  Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>16.3 inf.væske / inf.liquid  <b>Hydroxyethylstivelse/hydroxyethyl amyloid</b> 60 mg/ml  Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood / MFAG app. 13  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.1 Tablet / Tablet  <b>Dextromethorphan</b> 30 mg  Indikation / Indication: Hoste / Cough  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>16.5 Inj. væske / inj.liquid  <b>Natriumklorid / sodium chloride</b> 9 mg/ml  Indikation / Indication: Væske til gennemskyldning af intravenøs kanyle, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes  Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

# **INDEX**

Abdominal infections	31	Calciumlactogluconat, calciumcarbonat.	24
Abstinenskramper	27	Calciumlactogluconate, calciumcarbonate.	24
Acetylsalicylsyre	37	Cardiospasm	37
Acid indigestion	43	Caustic burns, fluorine	24
Acrivastin	18	Caustic burns, stomach, intestines	25
Acrivastine	18	Chlamydia	30; 31
Active carbon	25	Chlorhexidin.	40
Acute diarrhoea	32	Cholera	32
Acute mental disease	27	Cinchocain.	45
Acute mental illness	28	Cinchocaine.	45
Adrenalin	17	Cinnarizin	20
Aktivt kul	25	Ciprofloxacin	32
Akut diarré	32	Ciprofloxacine	32
Akut sindsyge	27; 28	Cold	49
Alcoholic withdrawal symptoms	27	Constipation	41
Alkoholabstinentser	27	Convulsions	27
Allergi	18; 19	Convulsions , universal	28
Allergic asthma	18; 19	Convulsions, poisoning	28
Allergic face oedema	18; 19	Convulsions, Withdrawal	28
Allergic shock	17	Coronary thrombosis	16; 36; 37
Allergisk ansigtsødem	18; 19	Cough	47
Allergisk astma	18; 19	Crab lice	39
Allergisk shock	17	Delusions	28
Allergy	18; 19	Dextromethorphan.	47
Angina pectoris	36	Diarré	41; 42
Angst	27; 28	Diarrhoea	42
Antacid	43	Diazepam	27; 28
Antacida	43	Difficulty falling asleep	29
Antidote, morphine	21	Dirty wounds, Disinfection	40
Antihæmoride creme	44	Dislocations	27
Anxiety	27; 28	Domperidon	44
Appendicitis	31; 32	Dysenteri	32
Arc eye	45	Dysentery	32
Asthma	48; 49	Eksem	39
Asthma-like breathing	48; 49	Epilepsi	27
Astma	48; 49	Epilepsy	28
Astmalignende vejtrækning	48; 49	Epinephrine	17
Atropin	23	Ernæringerstatning	50
Back pains	14	Erythromycin.	30; 31
Bevidstlös med vejtrækning	11	Ethyl alcohol	26
Bevidstlös uden vejtrækning	11	Ethyl alkohol	26
Bihulebetændelse	30; 49	Eyes, Treatment	52
Bleeding, after birth	47	Feber	14
Bleeding, miscarriage	47	Febertilstande	42
Blindtarmsbetændelse	31; 32	Female reproductions organs, infection	31
Blodfortynding	37	Fever	14
Blodprop i hjertet	15; 36; 37	Feverish conditions	42
Blodtab	50; 51	Fladlus	39
Blood-thinning	37	Flucloxacillin	34
Blurred vision	45	Flushing, intravenous needle	52
Blødning, abort	47	Fnat	39
Blødning, fødsel	47	Food substitute	51
Boil in the throat	32	Forbrændinger	15
Bone-ache	15	Forgiftning, insektgift	23
Bones, infections	34	Forgiftninger med methanol, ethylene glycol	26
Brandsår	38	Forgiftninger, mave, tarm	25
Breathing difficulties	11	Forhøjet blodtryk	37
Brud	27	Forkølelse	49
Brugervejledning Lægemiddelstoffer	10	Forstoppelse	41
Budesonid.	49	Fractures	15; 16; 27
Budesonide.	49	Frontal sinusitis	49
Burning sensation, skin	39	Furosemid	37
Burns	16; 38	Furosemide	38
Calciumgluconat	23	Fusidin	46
Calciumgluconate	24	Galdesten	15

Gall stone	16	Insulintilfælde	22
Gennemskylining, intravenøskanyle	52	Intact skin, Disinfection	40
Glaucoma	45	Intakt hud, desinficering	40
Glucagon	22	Intestinal infections	31
Glucocorticoid group II	39	Itching, rectum	44
Glucose and sodium chloride.	51	Kidney stone	16
Glucose og natriumklorid.	50	Klorhexidin.	40
Glukokortikoid gruppe II	39	Klorhexidin/ethanol.	40
Glyceryl trinitrate	36	Kløe, endetarmen	44
Glycerylnitrat	36	Kløestillende	12
Gonoré	32	Knoglebrud	14
Gonorrhoea	32	Knogleinfektion	31; 34
Grøn stær:	45	Knoglesmerter	14
Haemorrhoids	44	Kolera	32
Hallucinationer.	28	Kramper	27
Hallucinations.	28	Kramper, forgiftninger	27
Haloperidol	28	Kramper, universelle	27
Haloperidole.	28	Kvalme	44
Halsbetændelse	30	Kvalme og opkastninger	28
Halsbrand	43	Kvæstelser	15
Halsbyld	31; 32	Kæbehulebetændelse	49
Hands, Disinfection	40	Lactulose	41
Hay fever	18	Lavt blodsukker	22
Headache	14	Ledskred	27
Heart pain	36; 37	Ledsmerter	14
Heartburn	43	Legionella	30; 31
High blood pressure	38	Lette til moderate smerter	16
Hjertekrampe	36; 37	Lice	39
Hostestillende	47	Lidocain	11; 12
Hovedpine	14	Lidocaine	12
Hudkløe	39	Local anaesthetic, eye	45
Hudsve	39	Local anaesthetics	12
Human tetanus immunoglobulin	34	Lokal inflammatoriske øjenbehandling	46
Humant tetanus immunglobulin	34	Lokalbedøvelse	11; 12
Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.	46	Lokalbedøvelse, øjet	45
Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B comb.	46	Loperamid	41
Hydrocortison.	19	Loperamide.	42
Hydrocortisonsuccinate	19	Loss of blood	50; 51
Hydroxyethyl amyloid.	51	Loss of fluid	42
Hydroxyethylstivelse.	51	Loss of liquid	50
Hypoglycaemic coma	22	Loss of liquids	51
Hæmorider	44	Low blood sugar	22
Hænder, desinficering	40	Lung edema	38
Høfeber	18	Lungebetændelse	30; 35
Ibuprofen.	14; 15	Lungepest	32
Imminent premature birth	48	Lus	39
Indsovningsbesvær	29	Major wounds	16
Infection, Urinary tract	35	Mani, vildskab	28
Infections, oral cavity	30; 31	Mania, wildness	28
Infections, stomachulcer	31	Mavesår	43
Infektioner, stafylokokker	34	Mavesårsinfektioner	30
Inflammation, eye	46	Maxillary sinusitis	49
Inflammation, middle ear	30; 31	Medical oxygen	11
Inflammation, throat	30	Medicinsk ilt.	11
Inflammatory eye treatment	46	Medtaget almen tilstand	11
Injuries	16	Mellemørebetændelse	30; 49
Insect bites	39	Menstruationssmerter	14
Insecticides	23	Mental restlessness	28
Insektsbid	39	Methylergometrin.	47
Insektsgifte	23	Methylergometrine.	47
Insomnia	29	Metronidazol.	31
Instrumenter, desinficering	40	MFAG appendiks 7	46
Instruments, Disinfection	40	MFAG tabel 4, 5, 6	28
Insulin shock	22	MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	44
Insulinshock	22	MFAG tabel 8, 10, 11	42

MFAG tabel 8, 10, 11:	42	Relieves itching	12
MFAG tabel 10	25; 31	Restlessness	27
MFAG tabel 13	51	Rygsmerter	14
MFAG tabel 16	24	Salttab	42
MFAG tabel 17	23	Scabies	39
MFAG tabel 19	26	Seasickness	20
MFAG tabel 2, 3, 5, 9, 11	11	Severe bronchitis	32
MFAG tabel 4, 13	21	Severe injuries	11
MFAG tabel 4, 5, 6	27	Severe pain	16
MFAG tabel 7	45; 50	Shock	51
MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	44	Shock, forebyggelse	50
MFAG tabel 7, 8,10,13	15	Shock, prevention	50
MFAG tabel 7,8,10,13	16	Silver sulfadiazine	38
MFAG tabel 8, 16	23; 24	Sinusitis	30; 31; 49
MFAG tabel 9	30; 31; 48; 49	Smerter i hjertet	36; 37
MFAG tabel10	25	Smerter, afføring	44
MFAG tabel13	51	Smerter, øje	45
MFAG table 17	23	Sodium chloride	50; 52
Moderate pains:	15	Solskoldning	39
Moderate smerter:	14	Staphylococci	34
Modgift, morfin	21	Stivkrampemodgift	34
Morfin	15	Stivkrampevaccine	33
Morphine	16	Stomach ulcer	43
Motoric restlessness,	28	Stops breathing	21
Motorisk uro	28	Store sårskader	15
Mouth rinse	40	Stærke smerter:	15
Mundhuleinfektioner	30	Større kvæstelser	11
Mundskyldning	40	Sulfamethoxazol+trimitoprim	35
Muscle pains	15	Sulfamethoxazole+trimitoprim	35
Muskelsmerter	14	Sunburns	39
Naloxon	21	Sure opstød	43
Naloxone	21	Suture of wounds	12
Natriumklorid	52	Svage smerter	14
Natriumklorid.	50	Svejseøjne	45
Nausea	44	Svær bronkitis	32
Nausea and vomiting	28	Syning af sår	11
Nyrebaekkenbetændelse	32	Sølv sulfadiazin	38
Nyresten	15	Søsyge	20
Nældefeber	18	Søvnsløshed	29
Omeprazol	43	Sárbehandling.	52
Opkastninger	42; 44	Tandbyld	31; 32
Otitis media	49	Tarminfektioner	31
Oxygen	11	Terbutalin	48
Pain during defecation	44	Terbutalin.	48
Pain in joints	15	Terbutaline	48
Pains, eye	45	Tetanus antidote	34
Pandehulebetændelse	49	Tetanus holdig vaccine	33
Paracetamol	14	Tetanus vaccine	33
Paracetamol.	14	tetanustoxoid	33
Period pains	15	Tooth abscess	32
Permethrin.	39	Tramadol	16
Phenoxyethylpenicillin	30	Truende for tidlig fødsel.	48
Phenoxyethylpenicillin	30	Tågesyn	45
Pilocarpin	45	Udsættende vejtrækning	21
Pilocarpine	45	Unconscious with breathing	11
Pneumonia	30; 31; 35	Unconscious without breathing	11
Pneumonic plague	32	Underlivsinfektioner	31
Poisoning, insecticides	23	Urene sår, desinficering	40
Poisoning, methanole, ethylene glycole	26	Urethritis	32
Poisoning, stomach, intestines	25	Urinrørsbetændelse	32
Psoriasis	39	Urinvejsinfektioner	35
Psykisk uro	28	urotilstande	27
Pyelitis	32	Urticaria	18
Rainbow vision	45	User instruction Active Pharmaceutical Ingredients	10
Regnbuesyn	45	Vand i lungerne	37

Vejrtrækningsbesvær	11
Vomiting	42; 44
Vrangforestillinger	28
Væsketab	42; 50
Weak general condition	11
Weak pains:	14
Weak to moderate pain	16
Welders eye	45
Wounds, Treatment	52
Xylometazolin.	49
Xylometazoline.	49
Zolpidem	29
Ændringer /Changes	82
Ætsninger, fluorholdige	23; 24
Ætsninger, mave, tarm	25
Øjenbehandling	52
Øjenbetændelse	46
Øregangseksten	46

**Rekvisition lægemidler og udstyr**  
**Requisition Active Pharmaceutical Ingredient and equipment**

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
1.1	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	
1.1	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas	
1.3	-	Ekstra iltflaske	Gas	
1.3	-	Spare oxygen cylinder	Gas	
2.1 (π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	
2.1 (π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Væske	
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	
3.4 (π)	N02AA01	MorfinΔ	Inj. Væske	
3.4 (π)	N02AA01	MorphineΔ	Inj. Liqid	
3.5 (π)	N02AX02	TramadolΔ	Tablet / Kapsel	
3.5 (π)	N02AX02	TramadoleΔ	Tablets / Capsula	
4.1 (π)	C01CA24	Adrenalin "K"	inj. Væske	
4.1 (π)	C01CA24	Epinephrine "R"	inj. Liquid	
4.2 (π)	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	
4.2 (π)	R06AX18	Acrivastine	Capsula	
4.3 (π)	H02AB09	Hydrocortison	inj. tørstof + væske	
4.3 (π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	inj. Subst + solvens	
4.5 (π)	N07CA02	Cinnarizin Δ	Tablet	
4.5 (π)	N07CA02	CinnarizineΔ	Tablets	
5.1 (π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	
5.1 (π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "K"	inj. tørstof + væske	
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	
5.3 (π)	A03BA01	Atropin	Inj. Væske	
5.3 (π)	A03BA01	Atropine	Inj. Liquid	
5.4 (π)	D11AX03	Calcium gluconate	gel	
5.4 (π)	D11AX03	Calcium gluconate	gel	
5.5 (π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Brusetablet	
5.5 (π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Effervescent tablet	
5.6	A07BA01	Aktivt kul	pulver	
5.6	A07BA01	Charcoal, activated	powder	
5.7	-	Ethyl alcohol	Væske	
5.7	-	Ethyl alcohol	Liquid	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
6.2 (π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	
6.2 (π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	
6.3 (π)	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	
6.3 (π)	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	
6.4 (π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	
6.4 (π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Liquid	
6.5 (π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	
6.5 (π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	
7.1 (π)	J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	Tablet	
7.1 (π)	J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	Tablets	
7.4 (π)	J01FA01	Erythromycin	Tablet	
7.4 (π)	J01FA01	Erythromycin	Tablets	
7.7 (π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	
7.7 (π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	
7.8 (π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	
7.8 (π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	
7.10 (π)	J07AM01	Tetanus vaccine "K"	Inj. Væske	
7.10 (π)	J07AM01	Tetanus vaccine "R"	Inj. Liquid	
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablet	
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablets	
9.1 (π)	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund pray	
9.1 (π)	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	
9.3 (π)	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	
9.3 (π)	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablets	
9.4 (π)	C03CA01	Eurosemid	Tablet	
9.4 (π)	C03CA01	Eurosemide	Tablets	
10.4	D06BA01	Sølv sulfadiazin	Creme	
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion / Cream	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Creme	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion / Cream	
11.1	-	Klorhexidin/ethanol	Væske	
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol	Liquid	
11.2	-	Klorhexidine	Væske	
11.2	-	Chlorhexidin	Liquid	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	
12.6 (π)	A07DA03	Loperamid	Tablet	
12.6 (π)	A07DA03	Loperamide	Tablets	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Pulver	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet / Kapsel	
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazole	Tablets / Capsula	
12.9	A02A	Antacida	Tablet or oral pløsning	
12.9	A02A	Antacid	Tablets or oral solution	
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid og smertestillende middel)	Creme/Salve	
12.10	C05A	<i>Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)</i>	Lotion/ointment	
12.12 (π)	A03FA03	Domperidon	Tablet	
12.12 (π)	A03FA03	Domperidone	Tablets	
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocaine	Ointment	
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	
13.10 (π)	S03CA04	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb	Dråber	
13.10 (π)	S03CA04	Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B comb	Drops	
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Eye drops / gel	
14.2 (π)	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	
14.2 (π)	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablets	
15.2 (π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	
15.2 (π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	
15.4 (π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	
15.4 (π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	
16.1 (π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	
16.1 (π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + sodiumchlorid	Inf. Liquid	
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	
16.5	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	
16.5	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	

<b>Grp. No</b>	<b>Medicinsk udstyr / Medical equipment</b>	<b>Mængde/ Quantety</b>
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr	
A.1	Mobile resuscitation equipment	
A.4	Tungeholdere, størrelse 2	
A.4	Guidel airway, size 2	
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	
A.5	Guidel airway, size 3	
A.6	Tungeholdere, størrelse 4	
A.6	Guidel airway, size 4	
A.7	Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske	
A.7	Extra ventilation bag with valve and mask	
A.8	Kraftig klædesaks	
A.8	Strong scissors for clothes	
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	
B.2	Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	
B.2	Sterile gaze compress, approx.10 x 10 cm, approx. 8 layers	
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.6	Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm	
B.7	Gazeviskers,sterile	
B.7	Gauze swaps, non-sterile	
B.8	Tubegaze til fingerforbindinger	
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m	
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m	
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x1m	
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	
C.5	Vaskesvampe, éngangs	
C.5	Bath sponge, disposable	
C.6	Beskyttelsesbriller	
C.6	Protective goggles	
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	
D.1	Suturtape, Steri-StripTM	
D.1	Suturtape, Steri-StripTM	
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18x9x3 cm	
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	
D.7	Surgical scissors w/straight points	
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	
D.11	Splintpincet	
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	
D.12	Pean, krum	
D.12	Pean, curved	
D.13	Nåleholder	
D.13	Suture - holder	
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	
D.14	Safety razor, disposable single use	
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety
E.1	Kanylebøtte	
E.1	Box for contaminated needles	
E.2	Afsprøjningssvaps m. isopropylalkohol 70%	
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%	
E.3	Staserem	
E.3	Torniquet	
E.4	Optiva*2 , intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	
E.4	Optiva*2 , intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	
E.5	Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle	
E.5	Vecafix®, fixing plaster for intraveneos needle	
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	
F.1	Blodtryksmåler	
F.1	Instrument for measuring blood pressure	
F.2	Stetoskop	
F.2	Stethoscope	
F.3	Digitalt lægetermometer	
F.3	Digital clinical thermometer	
F.4	Pencillygte m. batterier	
F.4	Pencil lamp w/batteries	
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	
F.6	Pandelampe	
F.6	Head lamp	
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	
H.1	Lamp with UV light w/batteries	
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	
H.2	Fluorescent colour for the eye	
H.3	Vatpinde, sterile	
H.3	Cotton sticks, sterile	
H.5	Øjenklap	
H.5	Eye patch	
H.6	Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	
I.2	Urinkolbe, plastic	
I.2	Bed bottle, plastic	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantety
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	
J.4	Triangular scarf (Mitella)	
J.5	Sikkerhedsnåle	
J.5	Safety pins	
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	
K.4	Stiff neck collar, adjustable	
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	
O.1	Søfartsstyrelsens forskrifter om sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe	
O.1	Technical regulations on medical treatment and medicine on board ships issued by the Danish Maritime Authority	
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog	
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority	
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B	
O.3	Inventory, Controldocument and Userinstruction Category B MFAG B	
O.5	Radio Medical Optegnelser	
O.5	Radio Medical Records	
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. <a href="http://www.søfartsstyrelsen.dk">www.søfartsstyrelsen.dk</a>		
O.3 must be available in digital or printed version. <a href="http://www.dma.dk">www.dma.dk</a>		

# Ændringer /Changes

Marts 2020

Ændringer er nu på sidste side  
Changes is now a the last page

7.1 Phenoxymethylpenicillin styrken er ændret til 660 mg - 800 mg  
7.1 Phenoxymethylpenicillin strenght change to 660 mg - 800 mg

D.4 Sutur fjernet firma navn.  
D.4 Sutur removed company name

Note ved O.2 fjernet  
Note to O.2 is removed

November 2017

7.10 Tetanus vaccine ændre til Tetanusholdig vaccine  
7.10 Tetanus vaccine change to Vaccine containing Tetanus.

August 2017

O.2 Tilføjet nye lægebog fra Seahealth  
O.2 Add. new medical guide from Seahealth